

「長野県植物誌」補遺

清水建美 (編)

Tatemi Shimizu (ed.): Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture'

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに発見された追加すべき植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。品種には県外の分布域は記していない。新名の発表を要する分類群については他誌に譲りここでは取り上げていない。引用標本は特記するもの以外はすべて信州大学植物標本室(SHIN)に保管してある。

p. 272

ウツクシマツ (マツ科) *Pinus densiflora* Siebold et Zucc. f. *umbraculifera* Mayr

標本: 四賀村東北山 800m (横内文人 3399)
分布: 中部 (横内文人)

p. 322

サバノオ (キンボウゲ科) *Dichocarpum dicarpon* (Miq.) W.T. Wang et Hsiao

標本: 上村尾高山山腹 1450m (小沢正幸 2893, 1997.5.17)

分布: 南部。本州 (長野県・大阪府)・四国・九州。日本固有 (小沢正幸)

p. 327

イナヤマオダマキ (キンボウゲ科)

Aquilegia buergeriana Siebold et Zucc. f. *ecalcaratolanceolata* Asano

標本: 浪合村蛇峠山陣ヶ畑沢 1400-1500m (浅野一男 3869—基準標本, TI)

分布: 中部 (浅野一男)

p. 439

カンチャチハコベ (ナデシコ科)

Stellaria calycantha (Ledeb.) Bonard

標本: 大鹿村荒川岳 (牧内雅博, SIC)

分布: 南部 (南アルプス) の高山帯の水湿地に稀。北海道 (大雪山系)・本州 (南アルプス) (橋渡勝也)

p. 450

オオシラタマソウ (ナデシコ科) *Silene conoidea* L.

標本: 南牧村野辺山 990m (KPM94307)

分布: 東部。ヨーロッパ南部~西アジア原産の帰化植物 (橋渡勝也)

p. 462

シロバナトゲソバ (タデ科) *Persicaria senticosa* (Franch. et Sav.) H. Gross f. *albiflora* Honda

標本: 松本市稲倉 800m (松田行雄 8350)

分布: 中部 (花里弘)

シロバナミゾソバ (タデ科) *Persicaria thunbergii* (Siebold et Zucc.) H. Gross f. *viridialba* Iwata

標本: 豊科町新田 550m (横内文 1997.10.13), 麻積村 800m (SHIN73017), 茅野市八ヶ岳 2400m (SHIN104810), 山口村青野 600m (奥原弘人 771)

分布: 中部・南部 (花里弘)

p. 463

シロバナアキノウナギツカミ (タデ科) *Persicaria sieboldii* (Meisn.) Ohki f. *viridialba* Honda

標本: 飯山市沼湿原 900m (SHIN141425), 山口村とどめき 300m (SHIN119019)

分布: 北部・南部 (花里弘)

p. 464

シロバナオオイヌタデ (タデ科) *Persicaria lapathifolia* (L.) Gray f. *albiflora* Murai

標本: 松本市伊深 (横内文人 1992.8.3), 飯田市竜江細田 420m (浅野一男・浅野明子 1989.8.28)

分布: 中部・南部 (花里弘)

p. 498

ケナシアオギリ (アオギリ科) *Firmiana platanifolia* Schott et Endl. f. *platanifolia*

標本: 松本市開智 592m (SHIN053779)

分布: 中部。逸出 (横内文人)

p. 550

コシミノナズナ (アブラナ科) *Lepidium perfoliatum* L.

標本: 長野市篠ノ井 350m (SHIN89799), 木曾福島町児野 780m (SHIN88613)

分布：北部・南部に稀。本州。東ヨーロッパ・西アジア原産の帰化植物 (斉藤定美)
ベンケイナズナ ヒロハグンバイナズナ (アブラナ科) *Lepidium latifolium* L.

標本：坂城町坂城駅構内 400m (横内斎 1986.7.20)

分布：中部に稀。北海道・九州。ユーラシア大陸原産の帰化植物 (斉藤定美)

p.553

クロガラシ (アブラナ科) *Brassica nigra* (L.) Koch

標本：明科町大足 500m (横内文人 2440)

分布：中部。路傍。ヨーロッパ・西アジア原産の帰化植物 (斉藤定美・横内文人)

p.554

ミミイヌガラシ (アブラナ科) *Rorippa austriaca* (Crantz) Besser

標本：長野市飯綱高原 900m (SHIN80525), 小谷村小谷温泉 900m (SHIN90227), 明科町大足 500m (053926), 富士見町境 1000m (SHIN82075)

分布：北部・南部に稀。本州。ヨーロッパ原産の帰化植物 (斉藤定美)

ミチバタガラシ (アブラナ科) *Rorippa dubia* (Pers.) H. Hara

標本：辰野町小横川 830m (SHIN177714)

分布：全県の半陰地。稀。本州・四国・九州 (斉藤定美)

p.555

カマナシハタザオ (アブラナ科) *Arabis lyrata* L. var. *kamtschatica* Fisch. f. *kamanashiana* (H. Koidz.) T. Shimizu

標本：富士見町白岩岳 2200m (今井建樹 1965.6.8)

分布：南部の石灰岩地帯 (斉藤定美)

p.559

ミツバコンロンソウ (アブラナ科)

Cardamine anemonoides O.E.Schultz

標本：山口村賤母 (小沢正幸 2920), 豊丘村本谷 (奥原弘人 1932.5.22)

分布：南部に稀。本州 (関東地方以西)・九州 (斉藤定美・小沢正幸)

p.560

ミチタネツケバナ ケタネツケバナ (アブラナ科) *Cardamine hirsuta* L.

標本：小谷村小谷石坂 600m (高橋秀男 1997.5.21)

分布：北部。本州 (日本海側)。ユーラシア大陸原産の帰化植物 (斉藤定美)

p.567

シロバナホツツジ (ツツジ科) *Elliottia paniculata* (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. f. *albiflora* Y. Kimura

標本：飯田市伊賀良鳩打峠東斜面 (下伊那教育会 1932.9.4, SIC)

分布：南部 (横内文人)

p.571

ベニバナコメツツジ (ツツジ科)

Rhododendron tschonoskii Maxim. f. *roseum* Sugim.

標本：南木曽町和合 400m (116049)

分布：南部 (横内文人)

p.573

ウンゼンツツジ (ツツジ科) *Rhododendron serpyllifolium* (A.Gray) Miq.

標本：西駒ヶ岳 (TNS9573)

分布：南部。本州 (伊豆・紀伊半島, 中国地方)・四国 (東部)・九州 (大隅半島)。日本固有 (横内文人)

p.574

オオヤマツツジ (ツツジ科) *Rhododendron transiens* Nakai

標本：上松町小路方 700m (116946), 大桑村須原 600m (117784), 松川村福与寺沢 (下伊那教育会 1930.5.11, SIC), 飯田市三穂伊豆木 (村松光喜 1957.5.10, SIC), 同, 山本箱川大須 (下伊那教育会 1933.5.21, SIC), 天龍村中井侍 (KANA183305)

分布：南部の丘陵地の疎林。本州 (関東地方西部, 長野県)。日本固有 (横内文人)

p.579

ハンノウツツジ (ツツジ科) *Rhododendron × hannoense* Nakai

サツキツツジとヤマツツジの雑種

標本：天龍村大蛇 (下伊那教育会, SIC)

分布：南部。本州 (埼玉・長野両県)。日本固有 (横内文人)

p.583

コアブラツツジ (ツツジ科) *Enkianthus nudipes* (Honda) Ohwi

標本：南木曽町田立の滝上 1400m (SHIN116978)

分布：南部の岩場。本州 (長野・静岡・愛知各県, 紀伊半島) (横内文人)

p.583

オオハナヒリノキ (ツツジ科) *Leucothoe grayana* Maxim. var. *maximowicziana* Takeda

標本：長谷村塩見岳 (下伊那教育会, SIC), 飯田市伊賀良笠松山裏 (下伊那教育会, SIC), 阿智村恵那山不動滝 (下伊那教育会, SIC)

分布：南部。本州 (東北-近畿地方)。日本固有 (横内文人)

p.593

ナガミノツルコケモモ (ツツジ科)

Vaccinium oxycoccus L. f. *oblongicapus* (Komatsu) H.Hara

標本：諏訪市霧ヶ峰踊り場湿原 1530m (松田行雄 1997.10.10), 同, 車山湿原 1770m (松田行雄 1997.10.10)

分布：中部 (横内文人)

p.637

イワレンゲ (ベンケイソウ科) *Orostachys iwarenge* (Makino) H.Hara

標本：飯山市小境 500m (SHIN77171)

分布：北部に稀。栽培品の逸出か。本州 (関東地方以西)・九州。日本固有 (斉藤定美)

p. 696

オキジムシロ (バラ科) *Potentilla supina* L.

標本：松本市島立 580m (横内文人 2749)

分布：中部。本州 (長野・山梨・神奈川各県)。ヨーロッパ原産の帰化植物 (横内文人)

p.725

ムラサキメドハギ (マメ科) *Lespedeza juncea* (L. f.) Pers. var. *subsessilis* Miq.

標本：大町市山崎 800m (SHIN144176)

分布：北部 (中村英夫)

p. 740

ハマエンドウ ハマタニワタシ (マメ科)

Lathyrus japonicus Willd.

標本：飯山市桂池 800m (横内斎 1949), 長野市田子池 400m (SHIN8775), 信州新町水内

(SHIN91879)

分布：北部。河原や湖畔などの砂地。北海道～琉球 (中村英夫)

ヒロハノレンリソウ (マメ科) *Lathyrus latifolius* L.

標本：四賀村召田 680m (SHIN184178)

分布：中部。路傍。ヨーロッパ原産の帰化植物 (横内文人)

p.758

コマツヨイグサ (アカバナ科) *Oenothera laciniata* Hill

標本：明科町木戸 550m (SHIN184033)

分布：中部。北アメリカ原産の帰化植物 (横内文人)

p.775

ウラジロクロヅル (ニシキギ科)

Tripterygium regelii Sprague et Takeda f. *hypoleucum* H.Hara

標本：栄村鳥甲山 1300m (高橋秀男 0002), 山ノ内町高杜山 1200m (松田行雄 1199)

分布：北部 (馬場多久男)

p.909

タチヒルガオ (ヒルガオ科) *Calystegia*

pellita (Ledeb.) G. Don

標本：四賀村会田 600m (SHIN89910), 松本市県 600m (SHIN89914), 同, 筑摩 600m (SHIN147772), 同旭 600m (SHIN050590), 伊那市下殿島 650m (SHIN102588)

分布：中部・南部。荒地。本州 (長野県)。中国 (北部)・朝鮮 (北部)・シベリア (東部) 原産の帰化植物 (横内文人)

p.1059

イヌクイモ (キク科) *Helianthus strumosus* L.

標本：長野市川合大橋 (浅川富雄 1984 年), 美麻村 900m (SHIN179649), 堀金村岩原 500m (橋渡勝也 3751), 四賀村会田 600m (SHIN90053), 富士見町境 (SHIN80397), 下條村親田 680m (SHIN90053), 飯田市竜江區羽入田 420m (SHIN1417039)

分布：北部・中部・南部。荒地。本州 (長野・神奈川・千葉各県)。北アメリカ原産の帰化植物 (横内文人)

ヒメヒマワリ (キク科) *Helianthus*

cucumerifolius Torr. et Gray

標本：四賀村落水500m (SHIN84453), 松本市
新村600m (SHIN18208)

分布：中部。路傍。北アメリカ原産の帰化
植物 (横内文人)

タンゴギク (キク科) *Helenium autumnale* L.

標本：塩尻市勝弦900m (SHIN184171), 辰野
町しだれぐり公園980m (SHIN184180)

分布：中部・南。路傍。北アメリカ原産の
逸出帰化植物 (横内文人)

p.1139

ミサワアザミ (キク科) *Cirsium* × *misawaense*
Nakai

タイアザミとフジアザミの雑種。

標本：鬼無里村萩之峯760m (SHIN185045)

分布：北部。やや湿地。本州 (日光・神奈
川県丹沢山・長野県) (横内文人)

p.1201

ホソバハンゲ (サトイモ科) *Pinellia ternata*
(Thunb.) Breitenb. f. *angustata* Makino

標本：豊科町吉野570m (SHIN184310)

分布：中部 (横内文人)

p.1453

ウスギイロショウブ (アヤメ科) *Iris pseudoacorus*
L. cv. *Pallida*

標本：辰野町しだれぐり公園880m (SHIN185109)

分布：南部。水辺。西アジア～ヨーロッパ
原産の帰化植物 (横内文人)

p. 1454

ヒメヒオウギズイセン (アヤメ科) *Crocasmia*
× *crocosmiiflora* (Lemoine ex Morren) N.E. Brown

標本：白馬村落倉800m (SHIN176874)

分布：北部・中部・南部。明治中頃に渡来し
た園芸植物で、逸出帰化植物 (池田登志男)