

「長野県植物誌」補遺 (2)

清水建美 (編)

Tatemi Shimizu (ed.): Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (2)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本報はその第2報である。第1報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。引用標本は特記したもの以外は、すべて信州大学植物標本室(SHIN)に保管してある。30年以前の古い標本には採集番号のほか、採集年月日も付記した。品種には県外の分布域は記していない。

p.170

オオバシナミズニラ (ミズニラ科) *Isoetes sinensis* T.C. Palmer var. *coreana* (Y.H.Chung et H.K.Choi) M. Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono
標本: 松本市新田池 (SHIN179926)
分布: 中部。本州 (茨城・長野両県, 中国地方)・四国・九州 (大塚孝一)

p. 214

カタイノデ (オシダ科) *Polystichum makinoi* (Tagawa) Tagawa

標本: 天竜村藁野400m (大塚孝一1998.12.18)
分布: 南部 (下伊那)。本州 (関東地方以西)・四国・九州 (大塚孝一)

p. 214

オオタニイノデ (オシダ科) *Polystichum* × *ohtanii* Kurata

標本: 豊田村豊津370m (小沢正幸4511)
分布: 北部 (下水内)。本州 (北信・関東地方)。日本固有 (小沢正幸)

p. 214

カタイノデモドキ (オシダ科) *Polystichum* × *izuense* Kurata

標本: 天竜村藁野 (藤原陸夫・大塚孝一

1998.12.18)

分布: 南部 (下伊那)。本州 (関東地方以西)・四国・九州 (大塚孝一)

p. 214

キヨズミイノデ (オシダ科) *Polystichum* × *kiyozumianum* Kurata

標本: 天竜村藁野 (松田行雄1998.12.18)
分布: 南部 (下伊那)。本州 (関東地方以西)・四国・九州 (大塚孝一)

p. 215

アズミノナライシダ (オシダ科) *Arachniodes* × *azuminoensis* Fujiw., Y. Matsuda, Yu. Abe et Otsuka

標本: 堀金村三田650m (藤原陸夫1998.8.7 — 基準標本, 長野県自然保護研究所)

分布: 中部 (安曇野)。長野県固有 (?) (大塚孝一)

p.227

ホタカワラビ (オシダ科) *Dryopteris amurensis* (Milde) Christ × *D. expansa* (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy

標本: 川上村毛木平 (大塚孝一1998.7.26)
分布: 東部。北海道・本州 (長野県以北) (大塚孝一)

p.252

ホソバフモトシケシダ (イワデシダ) *Deparia conilii* (Franch. et Sav.) M. Kato × *D. pseudoconilii* (Seriz.) Seriz.

標本: 豊丘村堀越 (大塚孝一1998.11.22)
分布: 南部。本州・九州 (大塚孝一)

p.270

イイダモミ アオオオシラビソモドキ (マツ科) *Abies firma* Siebold et Zucc. var. *iidensis* Kusaka
標本: 飯田市つんば平陣ヶ沢国有林 600m (古松隆明 1987. 2. 15, 1993. 2. 15, 93. 9. 20 & 1998. 10. 8)

分布: 南部。長野県固有 (古松隆明)

p. 273

トダイゴヨウ トダイゴヨウマツ (マツ科) *Pinus parviflora* Siebold et Zucc. var. *todaensis* Sugim.

標本：長谷村戸台800m (清水建美42501)

分布：中部。長野県固有 (清水建美)

p.314

ハゴロモモ フサジュンサイ (ハゴロモモ科)

Cabomba caroliniana A. Gray

標本：長野市 (寺島虎雄1954.8, SHIN3360)

分布：北部。本州・四国・九州。北アメリカ

原産。栽培逸出 (松田行雄)

p.383

アオジクユズリハ イヌユズリハ (ユズリハ科)

Daphniphyllum macropodum f. *viridipes* Ohwi

標本：南木曾町柿其川溪谷400m (SHIN01092)

分布：南部。 (松田行雄)

p.394

コモチミヤマイラクサ (イラクサ科)

Laportea macrostachya f. *bulbifera* Kitam.

標本：白馬村北城日向沢 800m (SHIN00347)

分布：北部。 (松田行雄)

p.398

ナンバンカラムシ (イラクサ科) *Boehmeria*

nivea (L.) Gaudich.

標本：山口村第9区360m (小沢正幸4558), 三穂

村立石 (村松光喜5942, 1927.9.25, TNS307195)

分布：南部。熱帯アジア原産

(小沢正幸・清水建美)

p.408

コガシワ (ブナ科) *Quercus* × *takatorensis*

Makino

標本：豊田村豊津370m (小沢正幸4547)

分布：北部。本州・九州 (小沢正幸)

p.410

オオバヤシャブシ (カバノキ科) *Alnus*

sieboldiana Matsum.

標本：三郷村東峠1200m (SHIN146255)

分布：中部・南部。本州 (福島県一和歌山県；

太平洋側) および八丈島。海岸の山地。砂防

緑化樹として利用されていて野生か植栽かは

不明 (中山冽)

p. 477

ヒメシャラ (ツバキ科) *Stuartia monadelph*

Siebold et Zucc.

標本：南信濃村青崩峠900-1000m (清水建美

42314, TNS671539)

分布：南部。

(清水建美)

p.506

サクラタチツボスミレ (スミレ科) *Viola*

grypoceras A. Gray f. *rosipetala* Hiyama

標本：茅野市小泉山 900m (伊藤昭介 9-

1, SHIN01310)

分布：中部。

(今井建樹)

p.874

エゾニユウ (セリ科) *Angelica ursina* (Rupr.)

Maxim.

標本：山ノ内町志賀高原田の原湿原1600m

(SHIN00022), 長野市飯綱高原1100m

(SHIN00025).

分布：北部。北海道, 本州 (長野県以北)

(松田行雄)

p.995

キバナウンラン (ゴマノハグサ科) *Linaria*

dalmatica (L.) Mill.

標本：上久堅村小川路峠 (村松光喜8605,

1959.5.24, TNS)

分布：南部。ヨーロッパ原産。栽培逸出

(清水建美)

p. 1199

ミドリヒメザゼンソウ (サトイモ科)

Symplocarpus nipponicus Makino f.

viridispathus. Ohara

標本：大岡村樋知大神社1080m (川上美保子

1998.7.13)

分布：中部。

(川上美保子)

p.1205

ムラサキコウキクサ (ウキクサ科) *Lemna*

japonica Landolt

標本：明科町中耕地 530m, 放棄養魚池

(SHIN01067)

分布：中部。全国

(松田行雄)

p.1215

ヒメウキクサ (ウキクサ科) *Lemna miniscula*

Herter

標本：穂高町矢原温水溜池525m (松田行雄,

1998.7.23) 標本番号00011, 00012

分布：中部本州 (長野県, 静岡県, 奈良, 兵庫)

p.1215

ヒメコウガイゼキショウ (イグサ科) *Juncus*

bufonius L.

標本：佐久町中尾の池1000m (SHIN183762)

分布：東部。北海道—九州 (松田行雄)

p.1228

シログワイ イヌシログワイ (カヤツリグサ科) *Eleocharis dulcis* (Burm.f.) Trin.

標本：大町市常磐原村 680m, 放棄水田 (SHIN00347)

分布：北部。本州 (関東地方以西) —琉球 (松田行雄)

p.1229

ミカツキグサモドキ (カヤツリグサ科)

Rhynchospora × *hakkodensis* Mochizuki

標本：山ノ内町志賀高原田の原湿原1600m (SHIN00022)

分布：北部。本州 (八甲田山・志賀高原)。日本固有 (松田行雄)

p.1284

ノゲヌカスゲ (カヤツリグサ科) *Carex mitrata* Franch. var. *aristata* Ohwi

標本：上諏訪町大見山 (小泉秀雄4727 & 48094, 1923.5.13, TNS332946 & 332957), 三穂村下瀬 (小泉秀雄89906, 1932.4.30, TNS333269), 喬木村富田640m (小沢正幸346), 天龍村鷺巣262m (小沢正幸385)

分布：中部・南部。本州 (関東地方以西)・四国・九州 (小沢正幸・清水建美)

p.1343

セトガヤ (イネ科) *Alopecurus japonicus* Steud.

標本：中川村渡場, 天竜川左岸162.3km地点 (小沢正幸 天竜川-0019)

分布：南部。本州 (関東地方以西)・四国・九州 (小沢正幸)

p.1393

セイバンモロコシ (イネ科) *Sorghum halepense* (L.) Pers. var. *halepense*

標本：三郷村上長尾630m (小沢正幸44399)

分布：中部。北アメリカ原産の帰化植物 (小沢正幸)

p.1396

ハマガヤ (イネ科) *Diplachne fusca* (L.) P. Beauv.

標本：三郷村野沢610m (小沢正幸4563)

分布：中部。本州 (房総半島以西)・四国・九州 (小沢正幸)

p.1450

シブツアサツキ (ユリ科) *Allium maximowiczii* Regel var. *sibutuense* (Kitam.) Ohwi

標本：白馬村八方尾根1240m (今井建樹s.n., 1991.7.23)

分布：北部。本州 (中部)。日本固有 (今井建樹)

p.1408

ハナゼキシヨウ イワゼキシヨウ (ユリ科) *Tofieldia nuda* Maxim.

標本：美麻村青具片岡沢730m, 岩壁 (SHIN00013)

分布：北部。本州 (関東地方, 東海道西部, 近畿・中国地方)・九州 (松田行雄)