

「長野県植物誌」補遺 (3)

清水建美 (編)

Tatemi Shimizu (ed.): Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (3)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本報はその第3報である。第1, 2報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当項も示した。引用標本は特記したもの以外は、すべて信州大学植物標本室(SHIN)に保管してある。30年以前の古い標本には採集番号のほか、採集年月日も付記した。品種には県外の分布域は記していない。

p. 252

ホソバハクモウイノデ (イワデングダ科)

Diptera × *togakushiensis* Otsuka et Fujiw.
標本: 戸隠村森林公園 1220m (藤原陸夫 1999.9.22 - 基準標本, 長野県自然保護研究所)

分布: 中部(戸隠), 長野県固有(?)

(大塚孝一・藤原陸夫)

p. 596

オオベニイチヤクソウ (イチヤクソウ科)

Pyrola japonica Klenze ex Alef. f. *rosiflora* H. Hara

標本: 長谷村鹿嶺高原 1850m (SHIN191867)

分布: 南部 (今井建樹)

p. 626

コガクウツギ (アジサイ科) *Hydrangea luteovenosa* Koidz.

標本: 大桑村阿寺川 650m (SHIN191865)

分布: 南部(木曽)。本州(中部) - 九州。

日本固有。 (藤原陸夫)

p. 631

エソスグリ (スグリ科) *Ribes latifolium*

Jancz.

標本: 三郷村黒沢川黒沢橋下流 700m (SHIN3545)

分布: 中部。北海道・本州(岩手・山形・石川・長野各県)。日本固有。 (松田行雄)

p. 635

ムラサキベンケイソウ (ベンケイソウ科)

Sedum telephium L. var. *purpureum* L.

標本: 諏訪市霧が峰池のくろみ 1540m (SHIN192099)

分布: 中部・東部。 (今井建樹)

p. 759

オオアカバナ (アカバナ科) *Epilobium hirsutum* L. var. *villosum* Hausskn.

標本: 上田市下塩尻千曲川河川敷 (SHIN189992)

分布: 中部(上田市)。福島・新潟・長野各県。 (池田登志男)

p. 792

ヒトツバハギ (トウダイグサ科) *Securinega suffruticosa* Rehder var. *japonica* Hurus.

標本: 茅野市長倉 870m (今井建樹 1980.9.27, SWC)

分布: 中部。本州(東北地方南部) - 九州。

(今井建樹)

p. 806

キバナノマツバニンジン (アマ科) *Linum virginianum* L.

標本: 茅野市米沢 900m (今井建樹 1986.10.10, SWC)

分布: 中部。北アメリカ原産の帰化植物。

(今井建樹)

p. 847

ミヤマウコギ (ウコギ科) *Eleutherococcus*

tricodon (Franch. et Sav.) H. Ohashi

標本：南信濃村遠山川 600m (奥原弘人 128179), 同, 加良沢渡下 600m (SHIN145533), 天龍村熊伏山 (SHIN3825)
分布：南部。本州 (関東地方以西の太平洋側)。日本固有。 (松田行雄)

p.896

タチガシワ (ガガイモ科) *Cynanchum magnificum* Nakai

標本：富士見町釜無 1400m (今井建樹 1976.8.12, SWC)
分布：中部。本州・四国。日本固有。 (今井建樹)

p.907

フカギレヒルガオ (新称) (ヒルガオ科) *Calystegia japonica* Choisy f. *lobatiflora* Hashido, nom. nud.

標本：塩尻市南内田 700m (SHIN190448)
分布：中部 (塩尻市) (橋渡勝也)
p.926

ヒロードクサギ (クマツツラ科) *Clerodendron trichotomum* Thunb. f. *ferrugineum* Ohwi

標本：小布施町雁田山 400m (SHIN95619)
分布：北部 (小布施町)。 (清水建美)
p.928

アレチハナガサ (クマツツラ科) *Verbena brasiliensis* Vell.

標本：岡谷市三沢 800m (SHIN177437)
分布：中部 (岡谷市)。南アメリカ原産の帰化植物。 (今井建樹)
p.928

ヒナビジョザクラ (クマツツラ科) *Verbena tenera* K. Spreng.

標本：松本市 (SHIN191137), 川上村上駅 1100 (SHIN191138)
分布：中部 (松本市)・東部 (川上村)。南アメリカ原産の帰化植物。 (清水建美)
p.933

テイネニガクサ (シソ科) *Teucrium teinense* Kudo

標本：信濃町上山桑 750m (SHIN191862)

分布：北部。北海道・本州 (中部地方以北, 日本海側)。日本固有。 (藤原陸夫)
p.933

イヌニガクサ (シソ科) *Teucrium veronicoides* Maxim. var. *brachytrichum* Ohwi

標本：長野市北郷 1000m (SHIN191863)
分布：北部。北海道・本州 (中部地方以北, 日本海側)。日本固有。 (藤原陸夫)
p.1034

ハナヤエムグラ (アカネ科) *Sherardia arvensis* L.

標本：堀金村須砂渡 700m (SHIN344)
分布：中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。 (松田行雄)
p.1034

シガオニアザミ (新称) (キク科) *Cirsium* × *sigaeense* Y. Matsuda, nom. nud.

標本：山ノ内町志賀高原熊ノ湯 1700m (SHIN3584)
分布：北部。本州 (長野県)。日本固有。 (松田行雄)
p.1145

シロバナネコヤマヒゴタイ (キク科) *Saussurea modesta* Kitam. form. *albiflora* Sugim.

標本：諏訪市霧ヶ峰車山湿原 1790m (SHIN185427)
分布：中部。 (今井建樹)
p.1177

カントウヨメナ (キク科) *Aster yomena* (Kitam.) Honda var. *dentatus* (Kitam.) H. Hara

標本：佐久市岩村田 (SHIN190441); 岡谷市長地東堀 700m (SHIN192100); 諏訪市中洲 700m (SHIN192101)

分布：東部。本州 (中部・関東地方)。日本固有。 (浅野一男・池田登志男・今井建樹)
p.1215

ナギナタクサイ (イグサ科) *Juncus tenuis*

Willd. var. *williamsii* Fernald

標本：佐久市佐久リゾート GC1000m
(SHIN6661)

分布：東部。北アメリカ原産の帰化植物
(中山 冽)

p.1259

センダイスゲ (カヤツリグサ科) *Carex lenta*
D. Don subsp. *sendaica* (Franch.) T.
Koyama

標本：山口村黍生 350m (SHIN191864 分布：
南部。本州－九州。 (藤原陸夫)

p.1259

アカンスゲ (カヤツリグサ科) *Carex*
loliacea L.

標本：長谷村入笠牧場－テイ沢 1700m
(KPM-NA0096477)

分布：南部。北海道・本州 (長野県)。
(勝山輝男)

p.1282

サップロスゲ (ハナマガリスゲ) (カヤツリ
グサ科) *Carex pilosa* Scop.

標本：信濃町鳥居川大橋 (KPM-0100180)
分布：北部。北海道－本州 (東北地方・新潟
県・長野県北部) (勝山輝男)

p.1454

ヒトフサニワゼキショウ (アヤメ科)
Sisyrinchium mucronatum Michx.

標本：南牧村野辺山高原 (KPM-NA0092007)
分布：北海道・本州 (長野県)。北アメリカ
原産の帰化植物。 (勝山輝男)

p.1499

コアニチドリ (ラン科) *Amisostigma*
kinoshitae (Makino) Schltr.

標本：信濃町黒姫山山麓 1250m (SHIN4423)
分布：北部。北海道・本州 (中部地方以北)。
(和田 清)