

「長野県植物誌」補遺(4)

清水建美(編)

Tatemi Shimizu (ed.): Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (4)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本報はその第4報である。第1-3報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。引用標本は特記したもの以外は、すべて信州大学植物標本室(SHIN)に保管してある。30年以前の古い標本には採集番号のほか、採集年月日も付記した。品種・雑種には県外の分布域は記していない。

p. 195

マツザカシダ (イノモトソウ科) *Pteris nipponica* Shieh

標本: 天龍村中井侍 420 m (NAC, 藤原陸夫 1997.11.12)

分布: 南部。本州(千葉県以西)・四国・九州。
(藤原陸夫)

p. 214

ツヤナシイノデモドキ (オシダ科)

Polystichum × *pseudo-ovatopaleaceum* Akasawa

ツヤナシイノデとイノデモドキの雑種。

標本: 山口村黍生 380 m (NAC, 大塚孝一 1999.10.24)

分布: 南部。 (大塚孝一)

p. 227

エンシュウベニシダ (オシダ科) *Dryopteris medioxima* Koidz.

標本: 飯田市座光寺 500 m (NAC, 大塚孝一 2000.3.25)

分布: 南部。本州(関東地方以西)・四国・九州。
(大塚孝一)

p. 227

ギフベニシダ (オシダ科) *Dryopteris kinkiensis* Koidz.

標本: 長野市浅川東条 460 m (NAC, 大塚孝一 2000.10.19)

分布: 北部。本州(秋田県以南)・四国・九州。
(大塚孝一)

p. 246

ヤマホソバイヌワラビ (オシダ科) *Athyrium* × *pseudospinescens* Serizawa

ヤマイヌワラビとホソバイヌワラビの雑種

標本: 牟礼村もとどり山 660 m (NAC, 大塚孝一 2000.10.7)

分布: 北部。 (大塚孝一)

p. 246

オオカラクサイヌワラビ (オシダ科)

Athyrium × *tokashikii* Kurata

カラクサイヌワラビとヒロハインヌワラビの
雑種。

標本：山口村黍生 380 m (NAC, 大塚孝一
1999.10.24)

分布：南部。 (大塚孝一)

p. 349

ヤエミヤマキンボウゲ (キンボウゲ科)

Ranunculus acris L. var. *nipponicus* H.Hara f.
plenus Honda

標本：穂高町燕岳 2600 m (SHIN184973)

分布：西部。 (横内文人)

p. 427

ノゲイトウ (ヒユ科) *Celosia argentea* L.

標本：穂高町燕岳 2600 m (SHIN184973)

分布：中部。本州 (西部)・四国・九州。熱帯
アメリカ原産 (?) の帰化植物。 (横内文人)

p. 451

イヌコモチナデシコ (ナデシコ科) *Petrorhagia*
nanteuillii (Bumaat) P.W. Ball et Heywood

標本：上田市上塩尻 430 m (SHIN)

分布：東部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(宮下昇三郎)

p. 500

ベニバナケキブシ (新称) (キブシ科)

Stachyurus praecox Siebold et Zucc. var.

leucotrichus Hayashi f. *roseus* F. Yokouchi, nom.
nud.

標本：穂高町中房川 980 m (SHIN185315),
大桑村阿寺川 1000 m (SHIN1172), 同 920 m
(SHIN920), 同柿其川 880 m (SHIN1173)

分布：西部・南部。 (横内文人)

p. 506

ナガバタチツボスミレ (スミレ科) *Viola*
ovato-oblonga (Miq.) Makino

標本：売木村岩倉キャンプ 1000 m (SHIN
00416)

分布：南部。本州 (中部地方以西)・四国・九
州。日本固有。 (今井建樹)

p. 541

ケコマイワヤナギ (ヤナギ科) *Salix rupifraga*
Koidz. f. *eriocarpa* (Kimura) Kimura ex H.
Ohashi

標本：奈川村小地名なし (SHIN88257, 横内
斎 1925.6.27-29); 同, 角ヶ平 1000 m
(SHIN88257, 横内斎 1925.6.27-29)

分布：中部。 (清水建美)

p. 546

カワイヌコリヤナギ (ヤナギ科) *Salix* ×
hapala Kimura

カワヤナギとイヌコリヤナギの雑種。

標本：麻績村 (SHIN159632)

分布：中部。 (清水建美)

p. 546

シロタチヤナギ (ヤナギ科) *Salix jessoensis*
Seemen × *S. triandra* L.

シロヤナギとタチヤナギの雑種。

標本：駒ヶ根市赤穂小池 700 m (SHIN
121664)

分布：中部。 (清水建美)

p. 546

ミョウジンヤナギ (ヤナギ科) *Salix* ×
kawamurae Kimura

オオネコヤナギとネコヤナギの雑種。

標本：喬木村小川川上流 900 m (SHIN 167642)

分布：南部。 (清水建美)

p. 546

ミヤコヤナギ (ヤナギ科) *Salix × thymasta*
Kimura

ネコヤナギとキヌヤナギの雑種。

標本：安曇村上高地 1500 m (SHIN189844)

分布：中部。 (清水建美)

p. 550

ヒメグンバイナズナ (アブラナ科) *Lepidium*
apetalum Willd.

標本：飯山市千曲川河原 (SHIN29276, 寺島
虎男 1941.6.1.)

分布：北部。アジア大陸原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 553

カラシナ (アブラナ科) *Brassica juncea*
Czernjew et Casson

標本：富士見町落合 (SHIN82331)

分布：中部。中央アジア原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 563

オオユリワサビ (アブラナ科) *Wasabia*
okinosisimensis Takenouchi

標本：信濃町黒姫山 (TNS137542, 153901,
富樫誠 1958.5)

分布：北部。本州 (日本海側)・九州。日本固
有。 (清水建美)

p. 563

ヒメアマナズナ (アブラナ科) *Camelina*
microcarpa Ardiz. ex DC.

標本：阿南町和合 (SHIN91709, 横内斎
1956.8.28)

分布：南部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 573

ツマベニチョウジコメツツジ (ツツジ科)
Rhododendron tschonoskii Maxim. var. *tetramerum*
(Makino) Komatsu f. *roseotinctum* Kurashige, N.
Kobayashi et Yukawa

標本：小諸市黒斑山 2300 m (TNS9508515)

分布：東部。 (清水建美)

p. 601

オオイワウチワ *Shortia uniflora* (Maxim.)
Maxim.

標本：栄村烏甲山 1300 m (SHIN204899) ;
山ノ内町平穏 (SHIN80583, 横内斎 1931.5)

分布：北部。本州 (青森-新潟県, 日本海側)。
日本固有。 (清水建美)

p. 603

ナガバイワカガミ *Schizocodon soldanelloides*
Siebold et Zucc. var. *longifolius* (T. Yamaz.) T.
Shimizu, stat. nud.

標本：大桑村阿寺国有林 1800m (SHIN
118923) ; 飯田市風越山 600m (SHIN
204994)

分布：南部 (木曾・下伊那)。本州 (中部,
太平洋側)。日本固有。

p. 603

シロバナナガバイワカガミ *S. soldanelloides*var. *longifolius* f. *albiflorus* T. Shimizu, nom. nud.

標本：大桑村柿其川 (MAK7414, 奥原弘人 1955.5)

分布：南部 (木曾)。

(注)「長野県植物誌」603頁のヤマイワカガミの標本はすべてナガバイワカガミであり、県内にはヤマイワカガミは産しないことがわかった。
(清水建美)

p. 625

ヒダカノリウツギ (アジサイ科) *Hydrangea**paniculata* Siebold et Zucc. f. *debilis* (Nakai ex H. Hara) Sugim.

標本：穂高町中房温泉 (MAK314925, 坂本圭司 1963.7.20)

分布：北部。 (浅野一男・菅原敬)

p. 632

メキシコマンネングサ (ベンケイソウ科)*Sedum mexicanum* Britt.

標本：四賀村落水 590 m (SHIN181711), 松本市渚 590 m (SHIN181687)

分布：中部。本州 (関東地方以西), 四国・九州。原産地不明の帰化植物。 (横内文人)

p. 666

ウスゲヤマザクラ (バラ科) *Prunus jamasakura*Siebold ex Koidz. f. *pubescens* (Makino) Ohwi

標本：飯田市羽入田原 500 m (SHIN151561)

分布：南部。 (中山冽)

p. 670

チョウジマメザクラ (バラ科) *Prunus* × *mitsuminensis* Moriya

カスミザクラとヤマザクラの雑種。

標本：富士見町釜無 1200 m (SHIN9953)

分布：南部。 (中山冽)

p. 670

ミヤマチョウジザクラ×タカネザクラ (バラ科) *Prunus apetalata* (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav. var. *monticola* T. Kawasaki et H. Koyama × *P. nipponica* Matsum.

標本：茅野市白薙沢 1900 m (SHIN127956)

分布：中部。 (中山冽)

p. 671

ヤマグチザクラ (新称) (バラ科) *Prunus* × *yamagutiensis* Okuhara, nom. nud.

カスミザクラとヤマザクラの雑種。

標本：山口村7区 400 m (SHIN184338)

分布：南部。 (中山冽)

p. 716

オクハラシロツメクサ (新称) (マメ科)*Trifolium repens* L. f. *okuharae* F. Yokouchi, nom. nud.

標本：松本市筑摩 600 m (SHIN9949. 20405)

分布：北部。 (横内文人)

p. 757

ヤマモモソウ (アカバナ科) *Gaura lindheimeri* Engelm. et Gray

標本：駒ヶ根市中沢 (SHIN22291, 寺島虎男 1937.7.8)

分布：南部。北アメリカ原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 843

コツリフネ (ツリフネソウ科) *Impatiens textori*
Miq. f. *minuscule* Hayashi

標本：戸隠村戸隠山 (SHIN189682, 横内斎
1964.8.20), 茅野市横谷溪谷 1450m
(SHIN177267), 富士見町入笠山 1800m
(SHIN177263, 今井建樹 1963.8.15)

分布：北部・中部。 (横内文人)

p. 886

シロバナフデリンドウ (リンドウ科) *Gentiana*
zollingeri Fawc. f. *albiflora* Tuyama

標本：真田町菅平 1300 m (SHIN202328)

分布：中部。 (今井建樹)

p. 912

マメダオシ (ネナシカズラ科) *Cuscuta australis*
R. Br.

標本：軽井沢町南軽井沢 (MAK313453, M.
Ono and A. Katsumi 1951. 9. 4) 大岡村大
花見 (MAK16836, 峯村まさ 1960.8.23)

分布：東部。北海道一琉球。

(浅野一男・菅原敬)

p. 928

ハマクサギ (クマツヅラ科) *Premna japonica*
Miq.

標本：四賀村会田 600 m (SHIN139544)

分布：中部。本州 (紀伊半島・山陽地方)・四
国・九州。国内帰化と思われる。(横内文人)

p. 935

コナミキ (シソ科) *Scutellaria guillelmi* A. Gray

標本：佐久市 (旧平根村) (MAK72034, 坂井
辰三郎 1926.8.28); 望月町 (旧春日村)

(MAK72033, 大日向金竜 1909.6)

分布：東部。本州 (千葉県以西) 一南西諸島。
日本固有。 (浅野一男・菅原敬)

p. 941

ナツノタムラソウ (シソ科) *Salvia lutescens*
Koidz. var. *intermedia* (Makino) Murata

標本：大桑村阿寺 (MAK17605, 奥原弘人
1959.6.2)

分布：南部。本州 (神奈川県一近畿地方)。日
本固有。 (浅野一男・菅原敬)

p. 942

ヒメハッカ (シソ科) *Mentha japonica* (Miq.)
Makino

標本：北佐久郡浅間山麓 (MAK69584, 採集
者不明 1912.8.6)

分布：東部。北海道・本州。日本固有。

(浅野一男・菅原敬)

p. 942

オランダハッカ (シソ科) *Mentha spicata* L. var.
crispata Schrader

標本：長野市岡田工業高校校庭西側
(MAK18212, 峯村まさ 1961.8.19)

分布：北部。帰化植物。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1003

イワブクロ (ゴマノハグサ科) *Penstemon*
frutescens Lamb.

標本：白馬村白馬山 (MAK182545, 矢部吉禎
1902)

分布：北部。北海道・本州 (北部)。

(注) 標本はほぼ 100 年前にとられたものであ
り、北アルプスからは絶滅したと思われる。

(浅野一男・菅原敬)

p. 1026

アカバナヤイトバナ (アカネ科) *Paederia foetida* L. f. *shinanoensis* F. Yokouchi, nom. nud.

標本: 松本市村井 600 m (SHIN184913), 明科町犀川 522 m (SHIN181253)

分布: 中部。 (横内文人)

p. 1029

ハナムグラ (アカネ科) *Galium dahuriicum* Turcz. var. *tokyoense* Cufod.

標本: 八ヶ岳 (SHIN31855, Y. Iigo 1950.7.26)

分布: 中部。本州 (東北・中部地方)。

(横内文人)

p. 1037

ケカンボク (スイカズラ科) *Viburnum opulus* L. var. *calvescens* (Rehder) H. Hara f. *puberulum* (Komarov) Sugim.

標本: 長野市中曽根一大座法師池 (MAK36082, 水島正美 1964. 6. 4)

分布: 北部。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1041

マルバヨノミ (スイカズラ科) *Lonicera caerulea* L. subsp. *edulis* (Turcz.) Hulten var. *venulosa* (Maxim.) Rehder

標本: 八ヶ岳 (MAK170140, 中江純次郎 1911. 8.23); 諏訪郡麦草峠—篇枯山 (MAK33713, 水島正美 1959.7.22); 白馬村白馬山 (MAK170144, 志村寛 1907.7); 荒川岳東 (MAK309824, 奥原弘人 1931.8.7); 本沢温泉—渋の湯 (MAK63750, G. Murata & T.

Horikawa 1955.6.19)

分布: 中部。北海道 (南部)・本州 (中北部)。
日本固有。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1046

ヒロハコツクバネウツギ (スイカズラ科) *Abelia serrata* Siebold et Zucc. f. *gymnocarpa* (Graebn.) Sugim.

標本: 王滝村柳ヶ瀬 (MAK309823, 奥原弘人 1959. 6)

分布: 南部。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1048

ケツクバネウツギ (スイカズラ科) *Abelia spathulata* Siebold et Zucc. f. *pilosa* Nakai

標本: 望月町滝ノ宮 (MAK191935, 千野喜重郎 1925. 6)

分布: 東部。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1091

カワラノギク (キク科) *Aster kantoensis* Kitam.

標本: 中川村小渋川 1500 m (SHIN); 松川町部奈小渋川 500m (SHIN)

分布: 南部。本州 (関東・東海地方)。日本固有。 (今井建樹)

p. 1132

シロバナモリアザミ (キク科) *Cirsium dipsacolepis* (Maxim.) Matsum. f. *albiflorum* F. Yokouchi, nom. nud.

標本: 四賀村金井 900 m (SHIN184044)

分布: 中部。 (横内文人)

p. 1177

エソノチチコグサ (キク科) *Antennaria dioica*

(L.) Gaertner

標本：長野県駒ヶ岳 (MAK189096, 川崎光次郎 1903.8.13)

分布：東部。北海道・本州。

(注)標本はほぼ 100 年前にとられたものであり、県内からは絶滅したと思われる。

(浅野一男・菅原敬)

p. 1202

イナヒロハテンナンショウ (サトイモ科)

Arisaema amurense Maxim. var. *inaense* Serizawa

標本：穂高町信濃坂 1200 m (SHIN202341) ;

飯島町シオジ平 1400 m (SHIN202342)

分布：中部・南部。本州 (長野・岐阜県)。

日本固有。 (今井建樹)

p. 1294

ピロードミヤコザサ (イネ科) *Sasa chartacea*

Makino var. *mollis* (Nakai) S. Suzuki

標本：茅野市巢栗平神社 1100 m (SHIN 170836)

分布：中部。本州 (太平洋側)。日本固有。

(清水建美)

p. 1418

ムラサキキスゲ ハチブセムラサキキスゲ

(ユリ科) *Hemerocallis dumortieri* Morren var. *esculenta* (Koidz.) Kitam. f. *violacea* Yokouchi ex T. Shimizu

標本：松本市鉢伏山 1900 m (SHIN15285)

分布：中部。 (横内文人)

p. 1418

ヤエムラサキキスゲ ヤエハチブセムラサ

キスゲ (ユリ科) *Hemerocallis dumortieri*

Morren var. *esculenta* (Koidz.) Kitam. f. *plena*

Yokouchi, nom. nud.

標本：松本市鉢伏山 1900 m (SHIN156018)

分布：中部。 (横内文人)

p. 1466

ヒナチドリ (ラン科) *Orchis chidori* (Makino)

Schltr.

標本：大桑村田光 900 m (SHIN202340)

分布：南部。 (今井建樹)

p. 1470

ヤマサギソウ (ラン科) *Platanthera mandarinorum* Rchb. f.

標本：阿智村神坂峠 (SHIN12652)

分布：南部。北海道—九州。 (横内文人)

p. 1477

ナガバノキソチドリ (ラン科) *Platanthera ophrydioides* Fr. Schm. var. *australis* Ohwi

標本：木曽福島町城山 1000 m (SHIN 202330-202332) ; 大桑村阿寺川右岸 500 m (SHIN202333)。

分布：南部。本州 (中部地方・紀伊半島) — 九州。日本固有。 (今井建樹)

p. 1479

ユウシュンラン (ラン科) *Cephalanthera erecta* (Thunb. ex Murray) Blume var. *subaphylla* Ohwi

標本：信濃町野尻湖 700 m (SHIN202334)。

分布：北部。北海道—九州。日本固有。

(今井建樹)

p. 1491

クモイジガバチ (ラン科) *Liparis truncata*

T. Hashim.

標本：大桑村田光 900 m (SHIN202338-202339)。

分布：南部。本州（中部地方）。日本固有。
(今井建樹)

p. 1492

ヒメスズムシソウ, ミヤマスズムシソウ (ラン科) *Liparis nikkoensis* Nakai
標本：山ノ内町岩菅山 (SHIN151234)。

分布：北部。本州（関東地方）。日本固有。

(今井建樹)

p. 1499

クモラン (ラン科) *Taeniophyllum glandulosum*
Blume

標本：南木曾町田立 300 m (SHIN202335-202337)。

分布：南部。本州（関東地方以西）。

(今井建樹)