

「長野県植物誌」補遺 (5)

清水 建美 (編)

Tatemi Shimizu (ed.): Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (5)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本書はその第5報である。第1-4報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。引用標本は特記したもの以外は、すべて信州大学植物標本室(SHIN)に保管してある。1970年以前の採集の古い標本には採集者・採集番号のほか、採集年月日も付記した。品種・雑種には県外の分布域は記していない。

p. 330

シロウマレイジンソウ (キンポウゲ科)

Aconitum pterocaule Koidz. var. *siroumense* (Nakai) Kadota, stat. et comb. nud.

標本: 白馬村白馬岳 (信濃博物調査会570, 969, 990, 991, 1912年, SHIN55901-55904); 同, 白馬尻1500 m (SHIN32152); 同, 猿倉1300 m (高橋秀男1968.9, SHIN189444, 180445); 戸隠村戸隠山 (SHIN32148); 戸隠牧場 (横内斎1964.8, SHIN32143); 同, 森林公園1200 m (SHIN154294); 同, 奥社 (清水建美1968.9, SHIN32147), 同, 中社 (寺島虎男1950.8, SHIN32175); 堀金村角蔵山 (SHIN183666). 分布: 北部。長野県固有。

[注] はじめの4枚の標本のほかは、アズマレイジンソウと同定されていたものである。茎の上半部がつる状になってよく伸びしばしば地上をはう点がアズマレイジンソウと異なる。(橋渡勝也)

p. 405

ミズコナラ (ブナ科) *Quercus × serratoides* Uyeki var. *crispuloserrata* Sugim.

ミズナラ×コナラ

標本: 波田町若沢寺跡900m (SHIN44843)

分布: 中部。(松田行雄・横内文人)

p. 423

ヒラウチワ (サボテン科) *Opuntia vulgaris* Mill.

標本: 明科町犀川500 m (SHIN56415).

分布: 中部。アメリカ合衆国原産の帰化植物。(横内文人)

p. 468

ハリタデ (タデ科) *Persicaria bungeana* (Turcz.) Nakai

標本: 松本市美ヶ原 (採集者名なし

1929.8.7, MAK13026); 王滝村二子持 (奥原弘人1961.10.15, MAK21760)

分布: 中部・南部。東アジア原産の帰化植物。(浅野一男・菅原敬)

p. 552

ハマカキネガラシ (アブラナ科) *Sisymbrium officinale* (L.) Scop. var. *leiocarpum* DC.

標本: 白馬村親海湿原 (横内斎1966.7.7, MAK65089)

分布: 北部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(浅野一男・菅原敬)

p. 611

ツルコナスビ ヨウシュコナスビ (サクラソウ科) *Lysimachia nummularia* L.

標本: 富士見町富里900 m (SHIN50201)

分布: 南部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(清水建美)

p. 686

ミヤマワレモコウ (バラ科) *Sanguisorba longifolia* Bertol.

標本: 木島平村北ドブ湿原1400 m (SHIN29988); 同, カヤの平1400 m (SHIN);

白馬村地藏の頭2000 m (SHIN); 同, 八方尾根

(SHIN29973);同,八方山1800 m (SHIN29972);
同,小日向山 (SHIN);美麻村向地区900-1000
m (SHIN)

分布:北部。北海道(日高地方)・本州(東北
—中部地方)。韓国・中国。

[注]従来ナガボノシロワレモコウまたはナガ
ボノアカワレモコウとされてきたものの一部。
花序は短く直立し、がくは暗紫色または白色。
雄しべは4本、萼裂片より長い。論文は鳴橋
ほか(2001)植物地理・分類研究49:129-135。
(清水建美)

p.693

オオヘビイチゴ タチロウゲ オオロウゲ
(バラ科) *Potentilla recta* L.

標本:四賀村会田新町640 m (SHIN52300)

分布:中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。
(横内文人)

p. 705

オオズミ (バラ科) *Malus toringo* (Siebold)
Siebold ex Vriese var. *zumi* (Matsum.) H.Hara
標本:立科町菅原(牧野富太郎1920,
MAK211308);開田村本川(奥原弘人
1965.9.14, MAK264600)

分布:東部。本州。日本固有。
(浅野一男・菅原敬)

p. 729

シロバナコマツナギ (マメ科) *Indigofera*
pseudotinctoria Matsum. f. *albiflora* Okuyama
標本:大岡村芦沼(峯村まさ1957.8.2,
MAK3498)

分布:中部。(浅野一男・菅原敬)

p. 784

フジウメモドキ (モチノキ科) *Ilex serrata*
Thunb. ex Murray f. *glabrifolia* Kurata

標本:売木村道仙沢 (MAK316574)

分布:南部。(浅野一男・菅原敬)

p.833

オッタチカタバミ (カタバミ科) *Oxalis stricta* L.
標本:三郷村野沢600 m (SHIN53662);同,
北小倉600 m (SHIN55580);四賀村取出650 m
(SHIN53765);同,大木戸590 m (SHIN55514);

明科町押野500 m (SHIN51506);同,押野山
600 m (SHIN55534,55560,55565);同,中条
500 m (SHIN55545,55549);同,明科駅500 m
(SHIN55555).

分布:中部。北アメリカ原産の帰化植物。
(横内文人)

p. 833

サワゼリ (セリ科) *Sium suave* Walter var.
ovatum H. Hara f. *nipponicum* Hiyama

標本:軽井沢(牧野富太郎1940.7.16,
MAK38217)

分布:東部。(浅野一男・菅原敬)

p.929

シロバナイブキジャコウソウ (シソ科) *Thymus*
quincecostatus Celak. f. *albiflorus* H. Hara

標本:麻績村聖山1100 m (SHIN183090);茅
野市八ヶ岳御小屋尾根1950 m SHIN202329).

分布:中部。(横内文人)

p. 1019

シロバナツリガネニンジン (キキョウ科)
Adenophora triphylla (Thunb. ex Murray) A.
DC. var. *japonica* (Regel) H. Hara f. *leucantha*
H. Hara

標本:売木村ブナノネ (MAK315853)

分布:南部。(浅野一男・菅原敬)

p.1053

ヤエタカネマツムシソウ (マツムシソウ科)
Scabiosa japonica Miq. var. *alpina* Takeda f.
plena H. Okuhara, nom. nud.

標本:白馬村八方尾根2000 m (SHIN41480).

分布:北部。(横内文人)

p.1139

ミサトアザミ (キク科) *Cirsium* × *misatoense*
M. Ikegami, nom. nud.

ネバリアズマヤマアザミ × ナンブアザミ

標本:三郷村室町橋650 m (SHIN56416-56419).

分布:中部。(横内文人)

p. 1189

ミズヒキモ (ヒルムシロ科) *Potamogeton octandrus* Poir. var. *miduhikimo* (Makino) H. Hara

標本：志賀高原蓮池 (MAK289706; 軽井沢町 (牧野富太郎1921, MAK227062))

分布：北部。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1189

ヒロハノセンニンモ (ヒルムシロ科)

Potamogeton leptcephalus Koidz.

標本：信濃町野尻湖 (大房剛1959. 9. 22, MAK272507, 272508)

分布：北部。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1315

カラスノチャヒキ (イネ科) *Bromus secalinus* L.

標本：長野市高田 (SHIN91643) ; 佐久市 (SHIN89699, 横内斎9699, 1961. 6)

分布：北部・東部。ヨーロッパ原産の帰化植物。 (白井伸和)

p. 1373

ヒメクリノイガ (イネ科) *Cenchrus pauciflorus* Benth.

標本：諏訪市上川堤防 (SHIN87917, 横内斎7917, 1961. 9)

分布：中部。中央アメリカ原産の帰化植物。 (白井伸和)

p. 1419

ミズギボウシ (ユリ科) *Hosta longissima* Honda

標本：山口村神坂大戸 (奥原弘人1955. 7. 17, MAK264765)

分布：南部。本州 (愛知県以西), 四国・九州。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1434

クロミノタケシマラン (ユリ科) *Streptopus streptoides* Frye et Rigg var. *japonicus* f.

atrocarpus (Koidz.) Ohwi

標本：御嶽山三の池一八号目 (水島正美1953. 8. 5)

分布：南部。 (浅野一男・菅原敬)

p. 1482

シロテンマ (ラン科) *Gastrodia elata* Blume

f. *pllaens* Tuyama

標本：松本市牛伏寺山1000 m (SHIN184063).

分布：中部。 (横内文人)