

「長野県植物誌」 補遺 (6) 清水 建美 (編)

Tatemi Shimizu (ed.): Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (6)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本書はその第6報である。第1-5報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。引用標本は特記したもの以外は、全て信州大学植物標本室(SHIN)に保管してある。1970年以前の採集の古い標本には採集者・採集番号のほか、採集年月日も付記した。品種・雑種には県外の分布域は記していない。

p. 172

ミモチスギナ(トクサ科) *Equisetum arven-se* L. f. *campestre* (Schultz) Klinge

標本: 長野市大池 1000m(MAK36068, 水島正美 1964. 6.)。

分布: 北部。 (和田 清)

p. 196

ツノダシクモノスシダ(チャセンシダ科) *A splenium ruprechlii* Kurata f. *dissect-um* H. Okuhara, nom. nud.

標本: 富士見町花場 1000m(SHIN 077076)。

分布: 中部。 (今井建樹)

p. 286

イナガヤ(イチイ科)

Torreya mucifera Sieb. et Zucc.

標本: 下条村合原 550m(SHIN 56662~56664)。

分布: 南部。 (横内文人)

p. 295

イヌガシ(クスノキ科)

Neolitsea aciculata Koidz.

標本: 豊丘村伴野神社 480m(SHIN 185765)。

分布: 南部。本州(千葉・東海・南畿・中国)・四国・九州。 (中山 洸・横内文人)

p. 381

ヨウロウマンサク(マンサク科) *H amamelis incarnata* Makino var. *brachypetala* F. Maekawa

標本: 上松町(小地名なし)(SHIN 56617~56619, 横内 斎 1964. 3. 4)。

分布: 南部。 (中山 洸・横内文人)

p. 389

ログワ(クワ科) *Morus latifolia* Poir.

標本: 長野市下駒沢 300m(SHIN 113153); 同松岡 300m(SHIN 99919)。

分布: 北部。山東省原産。 (和田 清)

p. 398

アオカラムシ(イラクサ科) *Boehmeria nipononivea* Koidz. f. *concolor* Kitam.

標本: 明科町天神原 500m(SHIN 38832)。

分布: 中部。 (横内文人)

p. 405

ホソバガシワ(ブナ科)

Quercus × *nipponica* Koidz.

標本：長野市飯綱原 1000m(MA K62738,
牧野富太郎 1904. 8.)。(カシワ×ミズナラ)
分布：北部。北海道・本州。(和田 清)

p. 439

ヤマハコベ(ナデシコ科)

Spergula uchiyamana Makino

標本：富士見町本郷 1100m(S H I N
099960)。
分布：中部。本州(近畿・中国)・四国・九
州。(今井建樹)

p. 444

アメリカナデシコ、ヒゲナデシコ(ナデシコ
科) *Dianthus barbatus* L.

標本：長野市若穂 300m(S H I N151049)。
分布：北部。欧州原産の帰化植物。(和田 清)

p. 483

ヒメオトギリ(オトギリソウ科)

Sarothra japonica Y. Kimura

標本：飯山市五束 400m(S H I N076142)。
分布：北部。本州～沖縄。(和田 清)

p. 495

ウサギアオイ(アオイ科)

Malva parviflora L.

標本：長野市若穂 300m(S H I N158898) ;
富士見町乙事 1000m(S H I N158971)。
分布：北部、中部。地中海沿岸原産の帰化
植物。(和田清・今井建樹)

p. 511

ケマルバスミレ(スミレ科)

Viola keiskei Miq. var. *okuboi* Makino

標本：長野市(小地名なし)(MA K31315) :
佐久町荒船山 1200m(S H I N56355)。
分布：北部、中部。本州・四国・九州。
(和田 清・中山 湧)

p. 529

コロシントソウ(ウリ科)

Citrullus colocynthis Schrad.

標本：長野市高田 300m(S H I N77231)。
分布：北部。アラビア、北アフリカ、小ア
ジア原産の帰化植物。(和田 清)

p. 545

ツガルヤナギ(ヤナギ科)

Salix × *tsugaluensis* Koidz.

標本：栄村平滝 300m(MA K1946, 1949, 水
島正美 1954. 5.)。(イヌコリヤナギ×キツ
ネヤナギ)
分布：北部。本州(北部、中部)。(和田 清)

p. 560

コシノタネツケバナ、コシジタネツケバナ
(アブラナ科) *Cardamine scutata* Thunb.

var. *koshiensis* Ohwi et Okuyama
標本：飯山市野々海 1000m(S H I N
077196)。
分布：北部。本州(新潟、北陸)。(和田 清)

p. 560

ホソバコンロンソウ(アブラナ科)

Cardamine tenuifolia Turcz.

標本：富士見町休戸 900m(S H I N120148)。
分布：中部。北海道。(今井建樹)

p. 576

ウラジロミヤマツツジ(ツツジ科)

Rhododendron albrechti Maxim. f.
hypoleucum Hara標本: 栄村鳥甲山 1300m (SHIN094527,
12831)。

分布: 北部。 (和田 清)

p. 583

オオウラジロハナヒリ(ツツジ科)

Eubotryoides grayana Hara var.
pruinosa Hara f. *psilocarpa* Hara標本: 鬼無里村奥裾花 1100m (SHIN
14096, 清水建美 1969. 6.)。

分布: 北部。 (和田 清)

p. 625

シロバナコアジサイ(ユキノシタ科) *H**ydrationgea hirta* Sieb. et Zucc. f.
albiflora Okuyama標本: 富士見町大萱 1100m (SHIN
101257)。

分布: 中部。 (今井建樹)

p. 627

オオミウツギ(ユキノシタ科) *Deutzia*
crenata Sieb. et Zucc. f. *macrocarpa*
Nakai標本: 富士見町入笠山 1800m (SHIN
177842)。

分布: 中部。 (今井建樹)

p. 649

フジアカショウマ(ユキノシタ科) *A*
stilbe thunbergii Miq. var.*fujisanensis* Ohwi

標本: 鬼無里村奥裾花 1300m (KPM9727)。

分布: 北部。本州(神奈川、山梨、静岡)。

(和田 清)

p. 666

シロノモモ(バラ科)

Prunus persica Stokes f. *alba* Hort.

標本: 明科町釜蓋 550m (SHIN56892)。

分布: 中部。 (横内文人)

p. 672

ウスアカノイバラ(バラ科) *Rosa*
multiflora Thunb. f. *rosipetala* Honda

標本: 四賀村大木戸 600m (SHIN57010);

富士見町釜蓋 1600m (SHIN105356)。

分布: 中部。 (横内文人・今井建樹)

p. 707

ハナエンジュ、ハナアカシア、バラアカシ
ア(マメ科) *Robinia hispida* L.

標本: 四賀村七嵐 750m (SHIN57223)。

分布: 中部。北米原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 729

タイワンコマツナギ(マメ科)

*Indigofera tinctoria*標本: 坂北村下田 500m (SHIN56965,
57224)。

分布: 中部。帰化植物。 (横内文人)

p. 731

シロバナゲンゲ(マメ科) *Astragalus*

sini-cus L. form. *laucanthus* Nakai
 標本：長野市高田 300m(MAK3472)。
 分布：北部。中国原産の帰化植物。(和田 清)

標本：明科町北村 530m(SHIN57067)。
 分布：中部。北米南部原産の帰化植物。
 (横内文人)

p. 738
 シロバナナンテンハギ(マメ科) *Vicea*
unijuga A. Br. f. *albiflora* F. Y
 okouchi, nom. nud.
 標本：明科町木戸 550m(SHIN120744)。
 分布：中部。(横内文人)

p. 757
 イヌヤマモモソウ(アカバナ科)
Gaura parviflora Dougl.
 標本：長野市布施高田 300m(SHIN54856,
 峰村まさ 1959. 8.)。
 分布：北部。北アメリカ(テキサス)原産の
 帰化植物。(和田 清)

p. 740
 ヒメヨツバハギ(マメ科)
Vicia deflexa Nakai var. *minor* Murata
 標本：富士見町白岩岳 2200m(SHIN
 123088)。
 分布：中部。本州(中国)・四国・九州。
 (今井建樹)

p. 759
 ウスグチョウジタデ(アカバナ科) *L*
udwigia epilobioides Maxim. ssp.
greatrexii Raven
 標本：白田町白田 700m(SHIN57289)。
 分布：東部。(中山 洸)

p. 743
 アメリカホドイモ(マメ科)
Apois americana Medic.
 標本：牟礼村霊泉寺(SHIN55391)。
 分布：北部。北アメリカ原産の帰化植物。
 (大塚孝一)

p. 764
 ヒロハミズタマソウ(アカバナ科) *C*
ircaea mollis Sieb. et Zucc. f. *ovata*
 Kitamura
 標本：岡谷市長地 760m(SHIN44316)。
 分布：中部。(今井建樹)

p. 750
 シュウカイドウ(シュウカイドウ科)
Begonia evansiana Andr.
 標本：明科町荻原 500m(SHIN57088)。
 分布：中部。中国～マレーシア原産の帰化
 植物。(横内文人)

p. 775
 ウラジロクロツル(ニシキギ科)
Tripterygium regelii Sprague et T
 ake-da f. *hypoleucum* Hara
 標本：長野市飯綱山 1500m(SHIN
 00080);飯山市斑尾山 1100m(MAK3797)。
 分布：北部。(和田 清)

p. 757
 ヒルザキツキミソウ(アカバナ科)
Oenothera speciosa Nutt.

p. 778
 アンドンマユミ(ニシキギ科) *Euonymus*

pauciflorus Maxim. subsp. *oligospermus*

Okuyama

標本：松本市穴口沢 1100m (SHIN 145354)。分布：中部。本州(福島)。

(横内文人)

p. 813

ウチワイタヤ(カエデ科) *Acer mono* Maxim. var. *ambiguum* (Pax) Rehder f. *cuneata* H. Okuhara, nom. nud.

標本：丸子町西内鹿教湯 700m (SHIN 71787)。

分布：中部。(清水建美・中山洌・横内文人)

p. 813

エゾイタヤ(カエデ科) *Acer mono* Maxim.

var. *glabrum* (Lev. et Van' t) Hara

標本：南牧村海の口 1000m (SHIN 94734)。

分布：東部。北海道・本州(奥羽・北陸)。

(中山洌・横内文人)

p. 839

シロバナグンナイフウロ(フウロソウ科)

Geranium eriostemon Fisch. var. *reinii* (Franch. et. Sav.) Maxim. f. *alba* Mizushima

標本：茅野市八ヶ岳ジョウゴ沢 2200m (SHIN 046922)

分布：中部。(今井建樹)

p. 892

シロバナガガイモ(ガガイモ科) *Metaplexis japonica* Makino f. *albiflora* Honda

標本：明科町犀川 530m (SHIN 57104)。

分布：中部。(横内文人)

p. 893

ツルガシワ、オオタチガシワ(ガガイモ科)

Vincetoxicum kitagawae Hiyama

標本：飯山市茶屋池 1100m (SHIN 187104)。

分布：北部。本州(関東以南)・四国。

(和田 清)

p. 897

ヒルガオモドキ、ギンサカズキ、ギンパイソウ(ナス科) *Nierembergia repens* Ruiz. et Pav.

標本：富士見町釜無 800m (SHIN 106190)。

分布：中部。南アメリカ原産の帰化植物。

(今井建樹)

p. 903

キンギンナスビ、ニシキハリナスビ(ナス科) *Solanum aculeatissimum* Jacq.

標本：長野市県町 300m (SHIN 91861, 横内斎 1958. 7.)。

分布：北部。南アフリカ・オーストラリア原産の帰化植物。

(和田 清)

p. 923

ヤナギハナガサ(クマツヅラ科)

Verbena bonariensis L.

標本：明科町光 600m (SHIN 57062)。

分布：中部。南米原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 932

エゾニガクサ、ヒメニガクサ(シソ科)

Teucrium veronicoides Maxim.

標本：長野市北郷 1000m (SHIN 191863)。

分布：北部。北海道(渡島)・本州(関東)。

(和田 清)

p. 933

オカタツナミソウ(シソ科)

Scutellaria brachyspica Nakai et Hara 標本：富士見町入笠山(SH I N 178747)。

分布：中部。本州(関東・東海・近畿・中国)、四国。(今井建樹)

p. 946

エゴマ(シソ科) *Perilla frutescens* Britt. var. *japonica* Hara

標本：長野市川合新田 300m(SH I N 89822, 横内斎 1956. 8.); 長野市丹波島 300m(MA K 1482, 峰村まさ 1956. 8.)。

分布：北部。中国・インド原産の帰化植物。(和田 清)

p. 946

シソ(シソ科) *Perilla frutescens* Britt. var. *acuta* Kudo

標本：長野市更北 300m(SH I N 35702, 柳沢俊夫 1962. 9.); 長野市篠の井 300m(MA K 1483, 峰村まさ 1952. 8.)。

分布：北部。中国～ヒマラヤ原産の帰化植物。(和田 清)

p. 957

カクトラノオ、ハナトラノオ、フジナミソウ(シソ科) *Physostegia virginiana* Benth. 標本：富士見町境(SH I N 80398)。
分布：中部。北アメリカ原産の帰化植物。(今井建樹)

p. 961

エダウチヘラオオバコ(オオバコ科) *P*

lan- tago lanceolata L. f. *composita* Farwell

標本：明科町潮 520m(SH I N 57085)。

分布：中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。(横内文人)

p. 995

シロバナモウズイカ(ゴマノハグサ科)

Verbascum blattaria L. f. *erubescens* Brugger

標本：四賀村会田 610m(SH I N 57217, 57283)。

分布：中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。(中山 洸・横内文人)

p. 1030

ヤブムグラ(アカネ科)

Galium niewerthi Fr. et Sav.

標本：茅野市八ヶ岳(SH I N 35238)。

分布：中部。本州(南関東)。(今井建樹)

p. 1039

ナガバガマズミ(スイカズラ科) *Viburnum erosum* Thunb. f. *lanceum* Sugimoto

標本：岡谷市今井 964m(SH I N 177913)。

分布：中部。(今井建樹)

p. 1045

ベニバナニシキウツギ(スイカズラ科)

Weigela decora Nakai f. *unicolor* Hara

標本：穂高町中房川 1000m(SH I N 185714)。分布：中部。(横内文人)

p. 1059

エゾノタウコギ(キク科) *Bidens radiata*

Thuill. var. *pinnatifida* Kitam.

標本：長野市大池 900m (SH I N156425)。

分布：北部。北海道。 (和田 清)

p. 1131

クルマアザミ (キク科)

Cirsium oligophyllum (F ranch. et S av.) Matsum. f. *obvallatum* Makino

標本：駒ヶ根市中曾倉 700m (SH I N 56550)。分布：南部。 (横内文人)

p. 1127

イイツナアザミ (キク科) *Cirsium* × *iizu-nense* H. Okuhara, nom. nud.

標本：長野市飯綱原 1000m (SH I N 128352)。(タカアザミ×ヤチアザミ)

分布：北部。 (和田 清)

p. 1199

ナベクラザゼンソウ (サトイモ科)

Symplocarpus nabekuraensis Otsuka et K. I noue

標本：飯山市鍋倉山関田峠 1100m (SH I N 205211)。

分布：北部。本州 (岩手県から福井県の日本海側)。

[注]論文は、K. Otsuka, R. Watanabe and K. I noue (2002):植物研究雑誌 77:2, p. 96-100; 大塚孝一 (2002):長野県自然保護研究所紀要 5:p. 1-8。 (大塚孝一)

p. 1227

ミツカドシカクイ (カヤツリグサ科) *Eleocharis wichurae* Bocklr. f. *petasata* Hara 標本：諏訪市科の木湿原 1400m (SH I N 187565)。

分布：中部。 (今井建樹)

p. 1232

サンカクホタルイ (カヤツリグサ科)

Scirpus × *trapezoideus* Koidz. nm. *tria-angularis* (Honda)

標本：諏訪市湖南 700m (SH I N170138)。(イヌホタルイ×カンガレイ)。

分布：中部。 (今井建樹)

p. 1238

オオシロガヤツリ (カヤツリグサ科)

Cyperus nipponicus Fr. et Sav. var. *spiralis* Ohwi

標本：長野市田子池 400m (SH I N65116, 横内文人 1966. 10.)。

分布：北部。本州 (信濃・近畿・中国)・四国。 (和田 清)

p. 1245

キタノカワズスゲ (カヤツリグサ科)

Carex echinata Murr.

標本：栄村苗場山 (MA K108908, 1907. 8.)。

分布：北部。北海道・本州 (陸中五葉山)。 (和田 清)

p. 1262

ホシナシゴウソ (カヤツリグサ科) *Carex maximowiczii* Miquel var. *levisaccus* Ohwi

標本：飯山市斑尾山 1300m (SH I N 187595)。

分布：北部。本州 (羽前、関東、中部、近畿、中国)。 (和田 清)

p. 1269

タカオスゲ (カヤツリグサ科)

Carex × *musashiensis* Ohwi

標本：岡谷市東堀 700m (SH I N100809)。
(ナルコス×ゲアゼスゲ)。

分布：中部。(今井建樹)

p. 1271

カミコウチシラスゲ(カヤツリグサ科)

Carex mollicula Boott f. *kamikochensis*

H. Okuhara, nom. nud.

標本：茅野市八ヶ岳赤岳鉱泉 2100m
(SH I N073043)。

分布：中部。(今井建樹)

p. 1271

イトアオスゲ(カヤツリグサ科) *Carex bre-viculmis* R. Br. var. *filiculmis* K uk.

標本：原村広河原沢 1800m (SH I N 202139)。

分布：中部。北海道・本州(東北・中信)。
(今井建樹)

p. 1273

アカンスゲ(カヤツリグサ科)

Carex loliacea L.

標本：富士見町大阿原湿原 1800m (SH I N 43005)。

分布：中部。北海道・本州(陸中五葉山)。
(今井建樹)

p. 1274

ミヤマアオスゲ(カヤツリグサ科) *Carex sachalinensis* F. S chmidt var. *longiuscula* Ohwi

標本：茅野市八ヶ岳夏沢峠～中山 (K P M 30452, 大場達之 1955. 8.)。

分布：中部。北海道・本州(関東・中部)。
(今井建樹)

p. 1275

カミカワスゲ、チョウセンアオスゲ(カヤツリグサ科) *Carex sabynensis* Less.

標本：原村八ヶ岳山麓 (MA K332297, 古瀬義 1954. 5.)。

分布：中部。北海道・本州(東北)。
(今井建樹)

p. 1278

メアオスゲ(カヤツリグサ科) *Carex brevi-culmis* R. Br. var. *aphanandra* T. Koyama

標本：富士見町立場川 (K P M15049)。

分布：中部。本州(南関東以南)・四国・九州。
(今井建樹)

p. 1322

ヤギムギ(イネ科)

Aegilops cylindrica Host

標本：長野市(小地名なし) (SH I N89721, 横内斎 1961. 7.)。

分布：北部。ヨーロッパ原産の帰化植物。
(和田 清)

p. 1342

ミヤマノガリヤス×シロウマノガリヤス(イネ科) *Calamagrostis sesquiflora* × *C. fauriei* var. *intermedia*

標本：栄村苗場山 (SH I N 87878, 85934, 横内斎 1965. 7.; SH I N87889, 87894, 横内斎 1965. 8.)。

分布：北部。(和田 清)

p. 1384

シロトダシバ、シロバレンシバ(イネ科)

Arundinella hirta Tanaka f. *glauca* Su-gimoto

標本: 諏訪市霧ヶ峰鎌ヶ池 1560m(SHIN 192920)。

分布: 中部。(今井建樹)

p. 1395

タカネノガリヤス×チョウセンガリヤス
(イネ科) *Calamagrostis sachalinensis*
× *Kengia hackelii*

標本: 茅野市八ヶ岳 2600m(SHIN 170817)。分布: 中部。(今井建樹)

p. 1482

アオテンマ(ラン科) *Gastrodia elata*
Blume f. *viridis* Makino

標本: 穂高町中房川 1000m(SHIN 185693)。分布: 中部。(横内文人)

p. 1491

アオジガバチソウ(ラン科) *Liparis*
krame-ri Fr. et Sav. f. *viridis* Makino標本: 茅野市北大塩峠 1100m(MAK331811,
水島正美 1969. 6.)。

分布: 中部。(今井建樹)

ナベクラザゼンソウ
Symplocarpus nabekuraensis Otsuka et K. Inoue

飯山市鍋倉山