

「長野県植物誌」 補遺(7) 清水建美(編)

Tatemi Shimizu (ed.): Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (7)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本書はその第7報である。第1～6報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。引用標本は各標本庫に保管してある。1970年以前採集の古い標本には採集者・採集年月日も付記した。品種・雑種には県外の分布域は記していない。

p. 168

イヌカタヒバ(イワヒバ科)

Selaginella maellendorffii Hieron.

標本: 天龍村福島 290m(MAK337155)。

分布: 南部。琉球(石垣島、西表島)。

(浅野一男)

p. 191

チチブイワガネ(ホウライシダ科)

Coniogramme intermedia Hieron. f. *nosei*

Kurata

標本: 明科町天田 800m(SHIN52465)。

分布: 中部。(横内文人)

p. 247

ミドリワラビ(イワデンダ科) *Debaria*

viridiflora (Makino) M. Kato

標本: 高森町下町泰山神社 520m(SHIN

51996); 天龍村上平 600m(MAK332533)。

分布: 南部。本州、四国、九州。

(浅野一男)

p. 278

ムレスギ(スギ科) *Cryptomeria japonica*

(Thunb. ex L. f.) D. Don f. *caespitosa*

(Makino) Sugimoto

標本: 波田町菖蒲沢 1300m(SHIN203734)。

分布: 中部。(横内文人)

p. 367

ナガミヒナゲシ(ケシ科)

Papaver dubium L.

標本: 明科町高瀬川 500m(SHIN58652);

明科町潮 500m(SHIN58602)。

分布: 中部。地中海地方原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 367

ヒナゲシ(ケシ科) *Papaver rhoeas* L.

標本: 明科町長峰山 800m(SHIN39535);

明科町高瀬川 500m(SHIN58660); 四賀村

新町会田川 600m(SHIN58672)。

分布: 中部。欧州原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 367

ケシ(ケシ科) *Papaver somniferum* L.

標本: 四賀村会田 630m(SHIN58690)。

分布: 中部。アラビアほか原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 400

ヒカゲミズ(イラクサ科)

Parietaria micrantha Ledeb.

標本：大鹿村鳥倉山林道(KPM37147)。

分布：南部。本州(関東、中部)。

(浅野一男)

p. 411

ウスゲヒロハハンノキ(カバノキ科)

Alnus × *mayrii* Callier

標本：飯山市関田峠 1000m(SHIN85193, 横内齋 1952年6月)。ハンノキとケヤマハンノキの雑種。

分布：北部。(横内文人)

p. 423

イヌホウキギ(アカザ科)

Axyris amaranthoides L.

標本：佐久町余地ダム 1100m(SHIN58200)。

分布：中部。北アジア、中央アジア、ヨーロッパ原産の帰化植物。(中山洸)

p. 427(補遺4)

ノゲイトウ(ヒユ科) *Celosia argenter* L.

標本：穂高町燕岳 2600m(SHIN184973)は誤記につき、訂正する。

標本：松本市女鳥羽川(SHIN37042)。

分布：中部。熱帯アメリカ原産の帰化植物。(横内文人)

p. 433

ハナハコベ(ナデシコ科)

Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.

標本：佐久市野沢 600m(SHIN58213)。

分布：中部。小アジア～アフガニスタン、西ヒマラヤ地方原産の帰化植物。

(中山洸)

p. 451

ムギセンノウ、ムギナデシコ(ナデシコ科)

Agrostemma githago L.

標本：明科町押野 500m(SHIN58666)。

分布：中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(横内文人)

p. 455

トガマダイオウ(タデ科)

Rumex × *togaensis* Tos. Kawahara

標本：下水内郡栄村苗場山(SHIN85979

横内齋、1958年7月)。マダイオウとエゾノギシギシの雑種。

分布：北部。(横内文人)

p. 458

オオハルタデ(タデ科) *Persicaria*

vulgaris Webb. et Moq. var. *pubescens* Namoto

標本：阿智村大野大野橋周辺 770m(MAK350306)。

分布：南部。北海道～琉球。(浅野一男)

p. 467

アオホソバタデ(タデ科) *Persicaria*

hydropiper Spach var. *graminea* Ohwi f. *viridis* Araki

標本：飯山市小菅 400m(SHIN84858 横内齋、1956年9月)：野沢温泉村野沢温泉

600m(SHIN85570 横内齋、1956年9月)。

分布：北部。(横内文人)

p. 546

トダイヤナギ(ヤナギ科)

Salix serissifolia × *S. gracilistyla*

標本：白馬村落倉 800m(SHIN180035)；

飯山市豊田 1000m (SH I N180827) ; 阿南町
大島 500m (SH I N054551)。コゴメヤナギ
とネコヤナギの雑種。
分布：北部、南部。 (中山冽・横内文人)

p. 550

ベンケイナズナ、ヒロハヒメグンバイナズナ、
ヒロハグンバイナズナ (アブラナ科)
Lepidium latifolium L.

標本：坂城町坂城駅 400m (SH I N89710 横
内齋, 1961 年 7 月)。

分布：中部。ヨーロッパ、西アジア、北ア
フリカ原産の帰化植物。 (横内文人)

p. 603

シロバナオオイワウチワ (イワウメ科)
Shortia uniflora Maxim. var.

macrophylla Honda f. *albena* Honda

標本：穂高町中房川 1200m (SH I N185031)。
分布：中部。 (横内文人)

p. 626

ヤエザキヤマアジサイ (アジサイ科)

Hydrangea serrata Seringe f. *plena*
Makino

標本：穂高町中房川 1400m (SH I N182987)。
分布：中部。 (横内文人)

p. 632

オカタイトゴメ (ベンケイソウ科) *Sedum*
oryzifolium Makino f. *pumilum* H. Ohba

標本：諏訪市霧ヶ峰 1800m (SH I N57311)。
分布：中部。 (中山冽)

p. 653

フイリユキノシタ (ユキノシタ科)

Saxifraga stolonifera Meerb. f. *tricolor*
Hara

標本：明科町叶中 590m (SH I N58905)。

分布：中部。 (横内文人)

p. 668

シダレウワミズザクラ (バラ科) *Prunus*
grayana Maxim. f. *pendula* Mizushima,
nom. nud.

標本：穂高町信濃坂 1200m (SH I N99609)。
分布：中部。 (横内文人)

p. 679

クマモミジイチゴ (バラ科) *Rubus*
crataegifolius × *R. palmatus* var.
coptophyllus

標本：穂高町烏川 750m (SH I N00027)。

クマイチゴとモミジイチゴの雑種。

分布：中部。 (松田行雄)

p. 682

トゲナシキビナワシロイチゴ (バラ科)

Rubus yoshinoi Koidz. f. *inermis* F.
Yokouchi, nom. nud.

標本：松本市岡田井深 700m (SH I N
181689)。

分布：中部。 (横内文人)

p. 699

イワナンキンナナカマド (バラ科)

Sorbus pachyphylla Koidz.

標本：白馬村落倉 800m (SH I N057716)。

分布：北部。本州 (三重)。 (中山冽)

p. 722

オオバメドハギ (マメ科)

Lespedeza daurica Schindl.

標本：坂城町ねずみ橋 400m(SH I N56407)。
分布：中部。朝鮮・中国・東シベリア原産の
帰化植物。(中山湧)

p. 729(補遺 6)

タイワンコマツナギ *Indigofera tinctoria*
は、コマツナギ *I. pseudotinctoria* であつ
た。補遺 6 より削除する。
(横内文人)

p. 779

ヒロハツルマサキ(ニシキギ科) *Euonymus*
fortunei (Turcz.) Hand. -Mazz. var.
radicans (Siebold ex Miq.) Rehder f.
carrierei (Vauvel) Rehder
標本：臼田町横山 700m(SH I N57818)。
分布：中部。(中山湧)

p. 903

ケイヌホオズキ(ナス科)
Solanum sarachoides Sendtner
標本：御代田町真楽寺 900m(SH I N
58334, 58335)。
分布：中部。南アメリカ原産の帰化植物。
(中山湧)

p. 931

セイヨウキランソウ、セイヨウジュウニヒト
エ(シソ科) *Ajuga reptans* L.
標本：明科町押野 高瀬川 500m(SH I N
58662)。
分布：中部。北ヨーロッパ原産の帰化植物。
(横内文人)

p. 937

シロバナヒキオコシ(シソ科) *Isodon*

japonicus H. Hara f. *albidus* H. Hara
標本：松本市伊深 700m(K P M95645)。
分布：中部。(横内文人)

p. 937

シロバナコウシンヤマハッカ(シソ科)
Isodon umbrosus (Maxim.) H. Hara var.
latifolius Okuyama f. *albescens* Okuyama
標本：四賀村新町 600m(SH I N88385, 横内
齋 1952 年 5 月)。
分布：中部。(横内文人)

p. 952

シロバナミソガワソウ(シソ科) *Nepeta*
subsessilis Maxim. f. *albiflora* Tatew.
標本：茅野市八ヶ岳北沢 1800m(SH I N
104810)。
分布：中部。(横内文人)

p. 955

シロバナイヌゴマ(シソ科) *Stachy riederi*
Cham. var. *hispidula* (Regel) H. Hara
f. *leucantha* Hiyama
標本：四賀村板場 700m(SH I N124751)。
分布：中部。(横内文人)

p. 956

シロバナヒメオドリコソウ(シソ科)
Lamium purpureum L. f. *albiflorum* Goir
標本：豊科町大口沢 600m(SH I N38802)。
分布：中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。
(横内文人)

p. 961

ホウキオオバコ(オオバコ科) *Plantago*

asiatica L.f. *paniculata* Honda

標本：松本市武石峰 1900m(SH I N93675, 185588)；山形村清水寺 1000m(SH I N 100896)。

分布：中部。(横内文人)

p. 961

ケバノオオバコ(オオバコ科) *Plantago*

asiatica L. f. *amamiana* H. Hara

標本：波田町黒川 1100m(SH I N136767)；本城村立峠 1000m(SH I N136821)。

分布：中部。(横内文人)

p. 963

オニイボタ(モクセイ科) *Ligustrum*

obtusifolium Sieb. et Zucc. f.

regelianum (Sieb.) Hiyama

標本：明科町木戸 500m(SH I N187734)；塩尻市広丘野村 600m(SH I N106663)；佐久市鼻顔神社 700m(SH I N57975)。

分布：中部。(中山冽・横内文人)

p. 963

セツツイボタ(モクセイ科) *Ligustrum*

obtusifolium Sieb. et Zucc. var.

leiocalyx (Nakai) H. Hara

標本：塩尻市堅石 700m(SH I N187751)；四賀村執田光 500m(SH I N90207, 横内齋 1963年10月)。

分布：中部。本州。(横内文人)

p. 979

シロバナオオイヌノフグリ(ゴマノハグサ科) *Veronica persica* Poir. f. *alba*

Durand.

標本：明科町犀川 500m(SH I N58514)。

分布：中部。

(横内文人)

p. 1023

シロバナミソカクシ(キキョウ科)

Lobelia chunensis L. f. *lactiflora* Hara

標本：明科町潮 520m(SH I N58941)。

分布：中部。(横内文人)

p. 1023

シロバナサワギキョウ(キキョウ科)

Lobelia sessilifolia Lamb. f. *leucantha*

Hara

標本：塩尻市東山 1400m(SH I N096763)。

分布：中部。(横内文人)

p. 1023

トガクシサワギキョウ(キキョウ科)

Lobelia sessilifolia Lamb. f.

sabbicolor Mizushima, nom. nud.

標本：戸隠村戸隠高原(SH I N90082 横内齋, 1963年8月3日)。

分布：北部。(横内文人)

p. 1034

ウスユキムグラ(アカネ科)

Asperula trifida Makino

標本：飯田市龍江細田 370m(MAK351271)；天龍村大河内峠 970~1040m(MAK351270)；天龍村大河内~大河内峠 900m(MAK351272)。

分布：南部。本州(関東地方南部以西)、四国、九州。

(浅野一男)

p. 1036

ハゴロモエノニワトコ(スイカズラ科)

Sambucus racemosa L. subsp.

kamtschaticum Hult. f. *lacera* Hara

標本：小谷村土沢林道 700m(SH I N 58707, 58708)。

分布：北部。(清水建美・和田房巨)

p. 1037

キミノカンボク(スイカズラ科) *Viburnum opulus* L. var. *sargentii* (Koehne)

Takeda f. *flavum* (Koehne) H. Hara

標本：奈川村神谷 110m(SH I N 59506, 59512)。

分布：中部。(中山湧)

p. 1039

ホソバガマズミ(スイカズラ科) *Viburnum dilatatum* Thunb. ex Murray f.

angustatum Sugimoto

標本：松本市一の瀬 1100m(SH I N 195085)。

分布：中部。(横内文人)

p. 1058

ミツバハンゴンソウ(キク科)

Rudbeckia triloba L.

標本：松本市杏 700m(SH I N 156063)。

分布：中部。北米原産の帰化植物。
(横内文人)

p. 1059

アメリカタカサブロウ(キク科)

Eclipta alba (L.) Hassk.

標本：坂城町鼠橋 400m(SH I N 58395)；佐久市中込新町 680m(SH I N 58487, 58488)。

分布：中部。熱帯アメリカ原産の帰化植物。
(中山湧)

p. 1072

ヒロハヤマヨモギ、ヒロハヒトツバヨモギ
(キク科) *Artemisia stolonifera* Komar.

標本：白馬村崩沢 1100m(SH I N 54864, 58685)。

分布：北部。本州(西部)、四国(愛媛)、九州。
(清水建美・横内文人・菅野康祐)

p. 1173

ウズラバタンポポ(キク科)

Hieracium maculatum Sm.

標本：岡谷市加茂町 790m(SH I N 58312)。

分布：中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。
(中山湧・小口好久)

p. 1178

ホソバノシバナ(シバナ科)

Triglochin palustre L.

標本：牟礼村飯綱東高原 850m(SH I N 55400)。

分布：北部。北海道、本州(東北、尾瀬、北信)。
(大塚孝一、尾関雅章)

p. 1225

エゾハリイ(カヤツリグサ科) *Eleocharis congesta* D. Don var. *thermalis* (Hulten)
T. Koyama

標本：阿南町堂の沢湿原 900m(SH I N 144567)。

分布：南部。北海道～九州。(浅野一男)

p. 1236

コチャガヤツリ(カヤツリグサ科) *Cypripus amuricus* Maxim. var. *japonica* Miq.

標本：阿智村里弓の又キャンプ場 840m

(MAK338823); 売木村茶臼山ゴルフ場 1070
～1140m(MAK342866)。

分布：南部。本州～琉球。 (浅野一男)

p. 1242

メアゼテンツキ(カヤツリグサ科)

Fimbristylis verata R. Br.

標本：阿南町新野(SHIN140466)。

分布：南部。本州、四国、九州。

(浅野一男)

p. 1245

イガガヤツリ(カヤツリグサ科)

Carex poystachyos Rotth.

標本：南相木村立岩湖 1100m(SHIN58220)、
明科町高瀬川 530m(SHIN58919, 58921)。

分布：中部。本州、四国、九州。

(中山湧・横内文人)

p. 1245

オオアオスゲ(カヤツリグサ科)

Carex lonchophora Ohwi

標本：売木村越太郎 800m(MAK317532)；

同 大平 880m(MAK329333)。

分布：南部。本州(関東以西)、四国、九州。

(浅野一男)

p. 1245

コミヤマカンスゲ(カヤツリグサ科) *Carex*
multifolia Ohwi var. *toriiiana* T. Koyama

標本：大鹿村下青木～上青木(KPM55691)。

分布：南部。本州(南関東、東海、福井、京都)。

(浅野一男)

p. 1245

ヒカゲハリスゲ(カヤツリグサ科)

Carex onoei Franch. et Sav.

標本：売木村売木トンネル付近 930m(MAK
337717)；天龍村熊伏山登山道 700m(SHIN
30046)。

分布：南部。北海道、本州。 (浅野一男)

p. 1287

ハチク(イネ科) *Phyllostachys nigra*

(Loddiges) Munro var. *Henonis* (Bean)

Stapf

標本：明科町上生野 510m(SHIN43344)；

同 押野山 550m(SHIN55528)。

分布：中部。北海道(中部以南)、本州、四国、
九州。中国原産で野生化。(横内文人)

p. 1287

マダケ・ニガダケ(イネ科) *Phyllostachys*
bambusoides Sieb. et Zucc.

標本：四賀村五常 500m(SHIN88953 横内
齋, 1966年8月)。

分布：中部。本州、四国、九州。中国原産と
言われる。野生化。(横内文人)

p. 1357

タマミゾイチゴツナギ(イネ科) *Poa*

acroleuca Steud. var. *submoniliformis*

Makino

標本：戸隠村戸隠高原 1100m(SHIN86578

横内齋, 1939年6月)；明科町大足 600m(SHIN
52490)。

分布：北部、中部。本州(陸中、関東、能登
以南)、四国、九州。(横内文人)

p. 1374

ムラサキオオエノコロ(イネ科) *Setaria*

× *pycnocoma* (Steud.) Henrard ex

Nakai f. *purpurascens* Hiyama

標本：松本市梓川中央橋 600m (SHIN 199934)。

分布：中部。 (横内文人)

p. 1401

モウコガマ (ガマ科)

Typha laxmannii Lepech.

標本：白田町佐久病院 700m (SHIN 58211, 58212)。

分布：中部。中国東北部～ヨーロッパ原産の
帰化植物。 (中山湧)

p. 1452

ウスイロアヤメ (アヤメ科) *Iris sanguinea*
Hornem. f. *pallidiflora* Tuyama

標本：塩尻市東山 1300m (SHIN 101204)。

分布：中部。 (横内文人)

p. 1452

シロアヤメ (アヤメ科) *Iris sanguinea*
Hornem. f. *albiflora* Honda

標本：下伊那郡阿智村神坂峠 1500m (SHIN 87447, 88297 横内齋, 1928 年 5 月)。

分布：南部。 (横内文人)

p. 1459

ニガカシュウ (ヤマノイモ科)

Dioscorea bulbifera L.

標本：天龍村大河内山山林道 1070m (MAK 351369)。

分布：南部。本州～琉球。 (浅野一男)

p. 1466

シロバナニョホウチドリ (ラン科) *Orchis*

Joo-iokiana Makino f. *albiflora* Sugim.

標本：大鹿村豊口山 (SHIN 12417 小泉秀雄, 1924 年 9 月)。

分布：南部。 (横内文人)

p. 1481

シロバナトキソウ (ラン科) *Pogonia*

japonica Rchb. f. f. *pallescens* Tatewaki

標本：山形村上大池 800m (SHIN 075087)。

分布：中部。 (横内文人)

p. 1484

シロバナネジバナ、シロネジバナ、シロモジ

ズリ (ラン科) *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames var. *amoena* (M. Bieb.) H. H
ara f. *albescens* Honda

標本：三岳村東京天文台 1100m (SHIN 125415)。

分布：南部。 (横内文人)

以上。