

〈資料〉

「長野県植物誌」補遺 (8)

清水 建 美 (編)*

Supplement to "Flora of Nagano Prefecture" VIII

Tatemi SHIMIZU (ed.)

「長野県植物誌」(1997年12月)で未確認とされた種類の中で同書出版後に新たに確認された植物および新たに県内で発見された植物を、同書の「補遺」に準じて収録した。本書はその第8報である。第1〜7報同様、情報提供者は分類群毎に明記し、利用の便を考慮して同書の該当頁も示した。引用標本は各標本庫に保管してある。1975年以前採集の古い標本には、採集者・採集年月日も付記した。品種・雑種には県外の分布域は記していない。

p.161

スギナモ (スギナモ科) *Hippuris vulgaris* L.

標本: 須坂市塩川 (NAC132736)。

分布: 北部。周北極地域。 (大塚孝一・尾関雅章)

p.168

タチクラマゴケ (イワヒバ科) *Selaginella nipponica* Franch. et Sav.

標本: 大鹿村桶谷 660~700m (SHIN, 奥原弘人, 1930年); 天龍村為栗 (TI, 浅野一男, 1966年5月15日); 南信濃村万古 (TI, 浅野一男, 1966年5月15日)。

分布: 南部。本州 (関東地方以西), 四国, 九州。

(浅野一男)

p.173

アカフユノハナワラビ (ハナヤスリ科) *Botrychium ternatum* (Thunb. et Murray) Sw. var. *pseudotenatum* (Sahashi) K. I. wats.

標本: 阿智村東栗矢 590~610m (MAK)。

分布: 南部。本州 (東北~関東, 伊豆大島)。

(浅野一男)

p.242

ケコシノサトメシダ (イワデンダ科) *Athyrium neg-*

* 清水建美 〒390-0313 松本市岡田松岡211-3

lectum Seriz. f. *pilosum* Kawahara et Nakaike, nom. nud.

標本: 売木村星の森オートキャンプ場 1200m (MAK)。

分布: 南部。 (浅野一男)

p.243

トガクシイヌワラビ (イワデンダ科) *Athyrium vidalii* (Franch. et Sav.) Nakai f. *togakushiense* Kurata

標本: 売木村長島峠 950m (MAK); 天龍村松島 350~400m (MAK)。

分布: 南部。 (浅野一男)

p.251

タマシケンダ (イワデンダ科) *Deparia japonica* × *D. pseudoconilii*

標本: 飯田市座光寺麻績神社 480m (MAK)。

分布: 南部。

シケンダとフモトシケンダの間種。 (浅野一男)

p.292

シバコブシ (モクレン科) *Magnolia* × *euchloa* Momiyama

標本: 白馬村和田野 850m (NAC129246)。

分布: 北部。本州 (陸奥)。

キタコブシとタムシバの間種。 (藤原陸夫)

p.367

トゲミゲシ, トゲミヒナゲシ (ケシ科) *Papaver hybridum* L.

標本: 明科町荻原 530m (SHIN63064, 63065)。

分布: 中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.394

ミヤマミズ (イラクサ科) *Pilea petiolaris* (Sieb. et

Zucc.) Blume

標本：天龍村上平 600~730m (MAK)。

分布：南部。本州（関東地方以西），四国，九州。

（浅野一男）

p.426

ホコガタアカザ（ヒユ科）*Atriplex hastata* L.

標本：佐久町余地ダム 1050m (SHIN57649, 57650)。

分布：中部。ヨーロッパ，北アフリカ，西アジア原産の帰化植物。

（中山 洸）

p.458

ヒメタデ（タデ科）*Persicaria erectminor* (Makino) Nakai

標本：大鹿村大河原市場 720m (TI, 浅野一男, 1964年8月)；浪合村陣畑 850m (SHIN)。

分布：南部。北海道~九州。

（浅野一男）

p.458

ヌカボタデ（タデ科）*Persicaria taquetii* (H. Lev.) Koidz.

標本：飯田市伊賀良黒川畔（下伊那教育会）；同 上飯田正永寺原（同）；同 上郷黒田（同）；上村北又沢 700m (SHIN)。

分布：南部。本州，四国，九州。

（浅野一男）

p.506

ホソイスミレ（スミレ科）*Viola grypoceras* A. Gray var. *pubescens* Nakai f. *hosoi* F. Maekawa et Hashimoto

標本：阿南町和知野 500m (SHIN61122)。

分布：南部。

（今井建樹）

p.519

イワフネタチツボツミレ（スミレ科）*Viola kusanoana* × *V. rostrata*

標本：小谷村大網 340m (SHIN61131)。

分布：北部。

オオタチツボツミレとナガハシスミレの間種。

（今井建樹）

p.519

アカネスミレ×サクラスミレ（スミレ科）*Viola phalacrocarpa* × *V. hirtipes*

標本：下諏訪町湯沢左岸 1000m (SHIN61132)。

分布：中部。

（今井建樹）

p.536

オオタチヤナギ（ヤナギ科）*Salix eriocarpa* Fr. et Sav.

標本：長野市荒安 700m (NAC81859)。

分布：北部。本州（関東以西），四国，九州。

（藤原陸夫）

p.577

ヤエザキニッコウキバナシクナゲ（ツツジ科）*Rhododendron* × *nikomontanum* Nakai f. *plenum* K. Imai et T. Shimizu

標本：茅野市八ヶ岳横岳 2800m (SHIN61138)。

分布：中部。

論文は植物分類・地理研究 52, 1:87 (2004)。

（今井建樹・清水建美）

p.649

アカバナトリアシショウマ（ユキノシタ科）*Astilbe thunbergii* (Siebold et Zucc.) Miq. var. *congesta* H. Boissieu f. *rosea* Honda

標本：大岡村たらら山 1100m (SHIN63974, 63975 横内文人, 1962年5月20日)。

分布：中部。

（横内文人）

p.661

スモモ（バラ科）*Prunus salicina* Lindl.

標本：豊科町大口沢 600m (SHIN38804)。

分布：中部。中国原産の帰化植物。

（横内文人）

p.672

トゲナシノイバラ（バラ科）*Rosa multiflora* Thunb. ex Murray f. *inermis* (Hisauti) Sugimoto

標本：明科町潮沢 550m (SHIN63800)。

分布：中部。

（横内文人）

p.763

ヤマタニタデ（アカバナ科）*Circaea* × *canadensis* Hill. var. *nishiriensis* Hara

標本：川上村千曲川 1350m (NAC81751)。

分布：中部。北海道（利尻島）。

ミヤマタニタデとエゾミズタマソウの間種。

（藤原陸夫）

p.767

ベニヤマボウシ（ミズキ科）*Benthamidia japonica* (Siebold et Zucc.) H. Hara f. *rosea* Hara

標本：大岡村根越 600m (SHIN63973 横内文人, 1964年6月14日)；富士見町立沢 1100m (SHIN63713)。

分布：中部，南部。

（横内文人）

p.833

ケカタバミ（カタバミ科）*Oxalis corniculata* L. var. *trichocaulon* Lev.

標本：明科町高瀬川 500m (SHIN58640)；同 小泉

500m (SHIN58703); 同 長 峰 山 900m (SHIN58744)。

分布: 中部。本州~九州。 (横内文人)

p.847

トゲナシヤマウコギ (ウコギ科) *Eleutherococcus spinosus* (L. f.) H. Ohashi f. *inermis* Yokouchi, nom. nud.

標本: 富士見町富里 950m (SHIN63726)。

分布: 南部。 (横内文人)

p.864

ケタカネイブキボウフウ (セリ科) *Libanotis coreana* (H. Wolff) Kitag. var. *alpicola* Kitag. f. *akaishiaolina* Yamazaki

標本: (SHINになし)。

分布: 南アルプス, ハヶ岳。谷川岳。

北アルプス以外にはえるもの。

論文は J. Jpn. Bot. 76: 275-281 (2001)

(清水建美)

p.882

シロバナタカネセンブリ (リンドウ科) *Swertia tetrapetala* Pall. subsp. *micrantha* (Takeda) Kitam. f. *leucantha* T. Shimizu

標本: 白馬村八方尾根 (KPM28477 高橋秀男, 1971年8月)。

分布: 北部。 (中山 洵)

p.929

ヒメヒャクリコウ (シソ科) *Thymus quinquecostatus* Celek. var. *canescens* C. A. Mey.

標本: 白馬岳 2800m (SHIN0180185); 白馬岳岩室~頂上小屋 (SHIN0157818)。

分布: 北部。本州 (北アルプス)。 (横内文人)

p.936

オオバヤマハッカ (シソ科) *Isodon inflexus* Kudo f. *macrophyllus* Kudo

標本: 長野市富士の塔山 900m (SHIN62299)。

分布: 北部。 (中山 洵)

p.947

アオジソ (シソ科) *Perilla flutescens* Britt. var. *acuta* Kudo f. *viridis* Kudo

標本: 四賀村新町 610m (SHIN63777)。

分布: 中部。中国? 原産の帰化植物。 (横内文人)

p.956

シロバナホトケノザ (シソ科) *Lamium amplexicaule* L. f. *albiflorum* Hiyama

標本: 四賀村岩井堂 700m (SHIN63816, 63817)。

分布: 中部。 (横内文人)

p.975

フラサバソウ (ゴマノハグサ科) *Veronica hederifolia* L.

標本: 小布施町栗ヶ丘 340m (SHIN62185)。

分布: 北部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(中山 洵・清水照雄)

p.1017

シロバナソバナ (キキョウ科) *Adenophora remotiflora* Miq. f. *leucantha* Honda

標本: 茅野市明治温泉 1700m (SHIN61126)。

分布: 中部。 (今井建樹)

p.1017

ホソバナソバナ (キキョウ科) *Adenophora remotiflora* Miq. f. *angustifolia* Mak.

標本: 茅野市明治温泉 1700m (SHIN61127)。

分布: 中部。 (今井建樹)

p.1023

シナノサワギキョウ (キキョウ科) *Lobelia sessiliflora* Lamb. var. *togakushiensis* H. Okuhara, nom.nud.

標本: 戸隠村戸隠スキー場 1100m (SHIN62978)。

分布: 北部。 (中山 洵・横内文人)

p.1030

ウスギカワラマツバ (アカネ科) *Galium verum* L. var. *trachycarpum* DC. f. *intermedium* Nakai

標本: 明科町犀川 520m (SHIN63182, 63183)。

分布: 中部。 (横内文人)

p.1037 (補遺7)

キミノカンボク (スイカズラ科)

標高: 110m を 1110m に訂正する。 (横内文人)

p.1043

ダイセンヒョウタンボク (スイカズラ科) *Lonicera strophophora* Franch. var. *glabra* Nakai

標本: 長野市三電神社 700m (NAC114649)。

分布: 北部。本州 (中国), 四国。 (藤原陸夫)

p.1092

ベニバナハルジオン (キク科) *Erigeron philadelphicus* L. f. *purpureus* Farwell

標本: 穂高町中房川 1200m (SHIN63788); 松本市神田 600m (SHIN63789); 松本市開智小学校 590m (SHIN63814)。

分布: 中部。 (横内文人)

p.1102

パンジンガンクビソウ (キク科) *Carpesium hasok-
awae* Kitamura

標本：南信濃村万古川 350m (NAC113885)。

分布：北部。本州 (近畿, 中国), 九州。

(藤原陸夫)

p.1150

ヒメキンセンカ (キク科) *Calendula arvensis* L.

標本：阿智村七久里 590~620m (MAK357162)。

分布：南部。地中海沿岸地方原産の帰化植物。

(浅野一男)

p.1197

フイリミズバショウ (サトイモ科) *Lysichiton camts-
chatcense* (L.) Schott f. *maculosa* Takeda

標本：信濃町古池 1180m (SHIN63161, 63162)。

分布：北部。

(横内文人)

p.1202

コウライマムシグサ (サトイモ科) *Arisaema penin-
sulae* Nakai

標本：阿智村伍和南沢林道 810~930m
(MAK354328)；飯田市上郷八王子 700~800m
(SHIN141639)；根羽村檜原 810~820m
(MAK358543)。

分布：南部。

(浅野一男)

p.1202

ホソバテンナンショウ (サトイモ科) *Arisaema an-
gustatum* Franch. et Sav.

標本：豊丘村池の沢 755~890m (SHIN86053)。

分布：南部。本州 (磐城, 関東, 東海, 甲信, 近畿)。

(浅野一男)

p.1202

ヤマザトマムシグサ (サトイモ科) *Arisaema* sp. (学
名は, まだない)

標本：阿智村原の平 700m (MAK354327)；飯田市上
郷八王子 700~800m (SHIN141659)；天龍村小野河
原 480~530m (MAK358550)；豊丘村野田平
840~860m (MAK342050)；根羽村檜原 810~820m
(MAK358547)；泰阜村万場 700m (MAK357272)。

分布：南部。

(浅野一男)

p.1207

ウスイロツユクサ (ツユクサ科) *Commelina com-
munis* L. f. *caeruleoourpurascens* Makino

標本：富士見町大平 1000m (SHIN63728)。

分布：南部。

(横内文人)

p.1213

コモチゼキシヨウ (イグサ科) *Juncus monticola*
Steud.

標本：根羽村小柄川 750m (NAC128684)。

分布：南部。北海道, 本州, 四国, 九州。

(藤原陸夫)

p.1233

イヌホタルイ (カヤツリグサ科) *Scirpus juncoides*
Roxb. var. *ohwianus* T. Koyama

標本：八千穂村筆岩 950m (SHIN61850)；阿智村古
料 570~580m (MAK)；売木村長島峠 940m
(MAK)；豊丘村原虻川大橋 420~550m (MAK)。

分布：中部, 南部。北海道, 本州~琉球。

(中山 洵・浅野一男)

p.1245

ヒロハオオタマツリスゲ (カヤツリグサ科) *Carex*
filipes Franch. et Sav. var. *arakiana* Ohwi

標本：戸隠村森林植物園 1220m (NAC87268)。

分布：北部。本州 (長野県, 丹後, 丹波, 安芸)。

(藤原陸夫)

p.1245

タテシナヒメスゲ (カヤツリグサ科) *Carex chinoi* T.
Koyama

標本：茅野市蓼科山 2500m (KYO 千野喜重郎,
1924年4月)。

分布：中部。本州 (長野県)。

(横内文人)

p.1245

ニイタカスゲ (カヤツリグサ科) *Carex aphanandra*
Franch. et Sav.

標本：豊丘村新九郎滝道 1250m (MAK)。

分布：南部。本州, 四国, 九州。

(浅野一男)

p.1266

ナガミヒメスゲ (カヤツリグサ科) *Carex oxyandra*
(Franch. et Sav.) Kudo f. *lanceolata* (Kukenth.) Ohwi

標本：川上村朝日岳 2500m (SHIN59333)。

分布：中部。

(友野増夫)

p.1287

ナリヒラダケ (イネ科) *Semiarrundinaria fastuosa*
(Mitford) Makino var. *fastuosa*

標本：駒ヶ根市中沢 700m (SHIN0201760, 寺島虎
男1936年10月10日)。

分布：南部。本州西南部原産。

(高橋一臣)

p.1290

フシゲサトチマキ (イネ科) *Sasa palmata* (Marliac)

Nakai f. *australis* (Makino) S. Suzuki

標本：朝日村鉢盛山 1800m (SHIN57571, 57572)。

分布：中部。 (中山 冽)

p.1298

シオバラザサ (イネ科) *Sasaella shiobarensis* (Nakai)

Nakai ex Koidzumi

標本：富士見町落合 850m (SHIN0201622)。

分布：中部。本州 (北部・中部)。 (高橋一臣)

p.1327

マカススキ (イネ科) *Aira caryophyllea* L.

標本：阿智村春日春日林道 600～610m (MAK357161)。

分布：南部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(浅野一男)

p.1373

チャチカラシバ (イネ科) *Pennisetum alopecuroides* Spereng. f. *erythraetum* Ohwi

標本：富士見町下葛木 720m (SHIN63830, 63831)。

分布：南部。 (横内文人)

p.1386

クロススキ (イネ科) *Miscanthus sinensis* Anderss. f. *nigrocens* Sugimoto

標本：富士見町立場川 900m (SHIN62830)。

分布：中部。 (横内文人)

p.1453

シロバナキシノウブ (アヤメ科) *Iris pseudacorus* L. cv. *Albiflora*

標本：明科町潮 520m (SHIN58677)。

分布：中部。西アジア～ヨーロッパ原産の帰化植物。

(清水建美・横内文人)

p.1489

アオバナヨウラクラン (ラン科) *Oberonia japonica* Mak. f. *viridescens* Makino

標本：大桑村野尻向 550m (SHIN61121)。

分布：南部。 (今井建樹)

p.1491

フガクスズムシソウ (ラン科) *Liparis fujisanensis* Maekawa

標本：山ノ内町志賀高原幕岩 1500m (SHIN89324 横内齋, 1931年7月11日)。

分布：北部。本州 (長野県, 静岡県)。 (中山 冽)

p.1495

モイワラン (ラン科) *Cremastra aphylla*

標本：南信濃村遠山川 700m (SHIN87501, 横内齋 1950年6月)。

分布：南部。 (中山 冽)

以上。