

<資料>

長野県の帰化植物目録

横内文人*・土田勝義

The flora of plant alien species in Nagano Prefecture, central Japan

Fumito YOKOUCHI and Katsuyoshi TSUCHIDA

I はじめに

帰化植物とは、①人間の活動によって、②外国から日本に持ち込まれ、③日本で野生化した植物である。この帰化植物が、長野県に何種類あるのかは、興味深い問題である。ここに長野県帰化植物目録を作成したので、追加・訂正をお願いしたい。

II 長野県の帰化植物目録

- (1) 長野県内で採集されている帰化植物の全リストである。
- (2) 科の配列は「日本の帰化植物 (2003)」によった。科内の配列は属名・種名の学名のABC順、和名、産量、県内の分布・国内分布、由来、原産地、渡来、参考等を記した。科名の次へ「日本の帰化植物 (2003)」の該当頁を示した。
- (3) 学名と和名、国内分布、由来、原産地、渡来等は「日本の帰化植物 (2003)」より、県内の産量と分布等は「長野県植物誌 (1997)」及び「同補遺1〜9」を参考にした。不足の情報は他の文献より補った。

- (4) 種毎の記述は次の様である。

- ① 産量：“普通”，“少”，“稀”の3区分とした。
- ② 分布：長野県を大きく分けし、4ブロックとした。県全体のときは“全県”とした。4ブロックの区分けは次の通りである。
 - ・北部-長野・飯山市，上・下水内郡，須坂・中野市，上・下高井郡，大町市，北安曇郡。
 - ・中部-上田・千曲・東御市，小県郡，埴科郡，松本・塩尻市，東筑摩郡，安曇野市，岡谷・諏訪・茅野市，諏訪郡。
 - ・東部-佐久・小諸市，北佐久郡，南佐久郡。

・南部-木曽郡，伊那・駒ヶ根市，上伊那郡，飯田市，下伊那郡。

稀なものにだけ、県内の新市町村名を付けた。岐阜県へ岐阜合併した“山口村”も特に含めてある。続けて国内分布を記した。北海道〜九州に分布しているものは、“全国”とした。

- ③ 由来：自然と逸出に分けた。“自然”は無意識的な帰化であり，“逸出”はもとは栽培目的のものである。
- ④ 原産地：もともとの生育地を記した。
- ⑤ 渡来：帰化時代を江戸，明治，大正，昭和，平成のようにした。ただし，昭和の戦後のものには，昭和（戦後）とした。
- ⑥ 参考：必要な場合に限り掲げた。
- ⑦ 目録中の敬称は，省略した。

SALICACEAE ヤナギ科 「日本の帰化植物 (2003)」なし

Populus alba L. ウラジロハコヤナギ，ギンドロ，ハクヨウ

稀。分布：東部（小諸市）。由来：逸出（街路樹）。原産地：ヨーロッパ〜中部アジア。

P. nigra L. セイヨウハコヤナギ，ボブラ

普通。分布：全県-全国で植栽。由来：逸出（街路樹）。原産地：ヨーロッパ。

Salix babylonica L. シダレヤナギ，イトヤナギ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（街路樹）。原産地：中央アジア。渡来：万葉集に詠まれているから、古い事が分かる。

S. koriyanagi Kimura コリヤナギ

稀。分布：北部（大町市）。由来：逸出（柳行李，切花）。原産地：朝鮮。

S. matsudana Koidz. cv. *Tortuosa* ウンリュウヤナギ

* 横内文人 〒399-7402 松本市民会館110

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（庭木，生け花用）。原産地：中国。

CANNABACEAE アサ科 「日本の帰化植物 (2003)」 p.42

Cannabis sativa L. アサ

稀。分布：中部（松本市）・東部（小諸市）-全国。由来：逸出（繊維）。原産地：中央アジア。渡来：古い（弥生時代には栽培されていたという）。

URTICACEAE イラクサ科 p.42

Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. *nippononivea* Koidz. カラムシ

少。分布：全県-本州以南。由来：逸出（繊維）。原産地：アジア東部～南部。渡来：古い。参考：帰化か自生かは不明。

form. *concolor* (Makino) Kitam. アオカラムシ

稀。中部（安曇野市）-本州（関東以南）～沖縄。中国。

var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq. ナンバンカラムシ，ラミー

稀。分布：南部（山口村・飯田市）-本州～琉球。由来：逸出（繊維）。原産地：アジア。渡来：古い。

POLYGONACEAE タデ科 p.44

Fagopyrum dibotrys (D. Don) H. Hara シャクチリソバ，シュッコソバ，ヒマラヤソバ

稀。分布：南部（山口村）-本州～九州。由来：逸出（薬用）。原産地：ヒマラヤ，中国南西部。渡来：昭和初期。

F. esculentum Moench ソバ

少。分布：全県。由来：逸出（食用）。原産地：東アジア北部。渡来：古い。

Fallopia convolvulus (L.) A. Love ソバカズラ

稀。分布：中部（松本市）・東部（小諸市・佐久市・南牧村）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパから西アジア。渡来：明治後期ごろと推定される。

F. dantatolata (F. Schmidt) Holub オオツルイタドリ

少。分布：全県-北海道～本州（近畿以東）。由来：自然。原産地：東北アジア。渡来：1950年以前。参考：自生種の可能性がある。

F. dumetorum (L.) Holub ツルタデ，ツルイタドリ

少。分布：北部・中部・東部-北海道，本州，九州。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：明治。参

考：自生説もある。

F. multiflora (Thunb.) Haraldson ツルドクダミ，カシュウ

少。分布：北部・中部・南部-本州～九州。由来：逸出（薬用）。原産地：中国。渡来：享保5年（1720年）。

Persicaria bungeana (Turcz.) H. Gross ex Kitag. ハリタデ

稀。分布：中部（松本市）・南部（王滝村）-本州，九州北部。由来：自然。原産地：北東アジア。渡来：大正初年。

P. orientalis (L.) Spach オオケタデ，オオベニタデ，ベニバナオオケタデ，ハブテコブラ

普通。分布：中部・東部・南部-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：東～南アジア。渡来：江戸時代。

P. pensylvanica (L.) M. Gómez アメリカサナエタデ

稀。分布：北部（長野市）・南部（王滝村）。由来：自然。原産地：北アメリカ東部。渡来：昭和（戦後）。

Polygonum arenastrum Boreau ハイミチヤナギ，コゴメミチヤナギ，コシチヤナギ

普通。分布：全県-北海道，本州。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：昭和（戦後）。

Rheum rhabarbarum L. カラダイオウ

稀。分布：南部（木曽町）。由来：逸出（薬用）。原産地：中国，シベリア。渡来：江戸時代。

Rumex acetosella L. ヒメスイバ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：明治初期と推定される。

R. conglomeratus Murray アレチギシギシ

稀。分布：北部（大町市），中部（松本市）・南部（天龍村）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

R. crispus L. ナガバギシギシ

少。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：明治。

R. obtusifolius L. エゾノギシギシ，ヒロハギシギシ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治中期ごろと推定される。

PHYTOLACCACEAE ヤマゴボウ科 p.50

Phytolacca acinosa Roxb. ヤマゴボウ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（食用）。原産地：ヒマラヤ～中国。渡来：江戸時代以前。

P. americana L. アメリカヤマゴボウ，ヨウシュヤマ

ゴボウ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（薬用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治年間らしい。

MOLLUGINACEAE ザクロソウ科 p.51

Mollugo verticillata L. クルマバザクロソウ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：江戸時代末期。

CARYOPHYLLACEAE ナデシコ科 p.54

Agrostemma githago L. ムギセンノウ, ムギナデシコ

稀。分布：中部（安曇野市）-北海道, 本州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

Cerastium glomeratum Thuill. オランダミミナグサ, アオミミナグサ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治末年。

Dianthus armeria L. ノハラナデシコ

少。分布：東部・南部-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

D. barbatus L. ヒゲナデシコ, アメリカナデシコ, ビジョナデシコ

稀。分布：北部（長野市）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：江戸時代末期。

Gypsophila muralis L. スカイトナデシコ

稀。分布：東部（佐久市）-北海道, 本州（神奈川・長野・兵庫県）。由来：逸出（観賞用?）。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Lepydodictis bolosteooides Fenzl ハナハコベ

稀。分布：東部（佐久市）-本州（千葉・神奈川・長野・兵庫県）。由来：自然。原産地：小アジア~中国西部。渡来：昭和（戦後）。

Lychnis coronaria (L.) Desr. フランネルソウ, スイセンノウ

少。分布：全県。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball et Heywood イヌコモチナデシコ

稀。分布：中部（上田市）-本州（関東以西）, 四国（徳島県）, 九州（北九州市）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ西部。渡来：昭和（戦後）。

Sagina procumbens L. アライトツメクサ, アライドツメクサ, トヨハラツメクサ

少。分布：北部・中部-北海道, 本州（青森・神奈

川・静岡・長野県）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ, 北アメリカ, オーストラリア, 北千島のアライト島やサハリン。渡来：昭和（戦後）。

Saponaria officinalis L. サボンソウ, シャボンソウ

普通。分布：全県-北海道~四国。由来：逸出（薬用, 観賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初期。

Silene alba (Mill.) E. H. K. Krause マツヨイセンノウ, ヒロハノマンテマ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

S. antirrhina L. ムシトリマンテマ

少。分布：東部・中部-本州（宮城県以南）, 四国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

S. armeria L. ムシトリナデシコ, ハエトリナデシコ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：江戸時代末期。

form. albiflora Sylveu シロバナムシトリナデシコ

稀。分布：北部（長野市）・中部（松本市・安曇野市）・南部（伊那市・阿智村）。

S. conoidea L. オオシラタマソウ

稀。分布：東部（南牧村）-北海道~九州（宮崎県）。由来：自然。原産地：ポルトガル, 南スペイン, 西南アジア。渡来：昭和（戦後）。

S. dichotoma Ehrh. フタタタマンテマ, ホザキマンテマ, マンテマモドキ

稀。分布：中部（松本市・朝日村・茅野市）-北海道~四国, 九州（宮崎県）。原産地：東及び東南ヨーロッパ。渡来：昭和。

S. noctiflora L. ツキミセンノウ

稀。分布：北部（白馬村）-北海道~四国。由来：自然。原産地：中部及び南部ヨーロッパ。渡来：明治。

Spergula arvensis L. var. *arvensis* ノハラツメクサ

稀。分布：中部（茅野市・原村）・南部（大鹿村）-北海道, 本州（長野県）, 九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治末期ごろ。

Stellaria graminea L. カラフトホソバハコベ

稀。分布：南部（伊那市）-北海道, 本州（福島・埼玉・新潟・長野県）。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：昭和（戦後）。

CACTACEAE サボテン科 なし

Opuntia vulgaris Mill. ヒラウチワ

稀。分布：中部（安曇野市）。由来：逸出（観賞用）。

原産地：アメリカ合衆国。

CHENOPODIACEAE アカザ科 p.64

Atriplex prostrata Boucher ex DC. ホコガタアカザ,
アレチハマアカザ

稀。分布：東部（佐久穂町）-本州～九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

Axyris amaranthoides L. イヌホウキギ, ヒロハクサボウキ

稀。分布：東部（佐久穂町）-本州（山形・長野県）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ, ロシア, カザフスタン, 北アジア。渡来：昭和。

Chenopodium ambrosioides L. var. *ambrosioides* アリタソウ

稀。分布：中部（塩尻市・松本市）-北海道, 本州（岩手・山形県以南）～九州。由来：自然。原産地：メキシコ。渡来：寛文年間（1661～1673年）と言う。

var. *anthelminticum* (L.) A. Gray アメリカアリタソウ

稀。分布：北部（飯山市）-本州～琉球。由来：逸出（駆虫薬原料）。原産地：熱帯アメリカ。渡来：古い。

var. *pubescens* (Makino) Makino ケアリタソウ

少。分布：北部・中部・南部-全国。原産地：熱帯アメリカ。

C. aristatum L. ハリセンボン

稀。分布：中部（東御市）-本州（東京都, 神奈川・長野・滋賀県）。由来：自然。原産地：東北アジア。渡来：明治。

C. glaucum L. ウラジロアカザ

稀。分布：北部（中野市）・中部（松本市・筑北村・岡谷市・茅野市）-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：明治中期。

C. pumilio R. Br. ゴウシュウアリタソウ, コアリタソウ, ゴウシュウアカザ

少。分布：北部・中部・東部-北海道～四国。由来：自然。原産地：オーストラリア。渡来：昭和。

Kochia scoparia (L.) Schrad. var. *scoparia* ホウキギ

少。分布：全県-全国。由来：逸出（食用, 草蓍）。原産地：ユーラシア。渡来：古い。

Salsola ruthenica Iljin ハリヒジキ, オニヒジキ

稀。分布：中部（塩尻市）-北海道, 本州（青森・長野県）。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：昭和。

AMARANTHACEAE ヒユ科 p.68

Amaranthus albus L. ヒメシロビユ, シロビユ

稀。分布：北部（長野市）-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：大正。

A. cruentus L. スギモリゲイトウ

稀。分布：中部（松本市）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：アジア。渡来：古い。

A. deflexus L. ハイビユ

稀。分布：北部（長野市）・東部（坂城町）-本州（関東以西）～琉球。由来：自然。原産地：不明。世界の熱帯～温帯に分布。渡来：大正。

A. hybridus L. ホソアオゲイトウ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：大正。

A. palmeri S. Watson オオホナガアオゲイトウ, タリノホアオゲイトウ

稀。分布：東部（佐久市）・南部（山口村）-本州, 九州, 琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

A. powellii S. Watson ホナガアオゲイトウ, イガホビユ

稀。分布：中部（朝日村・茅野市）・東部（小諸市・南牧村）-本州（宮城県以南）～九州。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

A. retroflexus L. アオゲイトウ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：大正。

A. tuberculatus (Mag.) Sauer ヒユモドキ

稀。分布：北部（長野市）-本州（群馬・長野県）。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

A. viridis L. ホナガイヌビユ, アオビユ

少。分布：北部・中部・南部-全国。由来：自然。原産地：南アメリカ。渡来：昭和。

Celosia argentea L. ノゲイトウ

稀。分布：中部（松本市）-本州（関東以西）～琉球, 小笠原。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：江戸時代。

C. cristata L. var. *childsii* Hort. ヤリゲイトウ

稀。分布：中部（坂城町）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ケイトウは熱帯地方。

RANUNCULACEAE キンボウゲ科 p.75

Anemone hupehensis Lemoine var. *japonica* (Thunb.)

Bowles et Stearn シュウメイギク, キブネギク

少。分布：北部・東部・南部-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：中国西南部。渡来：室町時代という。

Ranunculus arvensis L. イトキツネノボタン, トゲミオトコゼリ

稀。分布：北部（長野市）-本州〜九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

GUTTIFERAE オトギリソウ科 p.77

Hypericum perforatum L. セイヨウオトギリ

普通。分布：全県-本州, 九州。由来：逸出（のり面緑化）。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

PAPAVERACEAE ケシ科 p.78

Argemone mexicana L. アザミゲシ

稀。分布：東部（南相木村）。由来：逸出（観賞用）。原産地：メキシコ。渡来：江戸時代末期ごろ。

Eschscholzia californica Cham. ハナビシソウ

稀。分布：中部（安曇野市）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治初期。

Papaver commutatum Fisch. et Mey モンツキヒナゲシ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（茨城・長野県）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ東部から小アジア。

P. dubium L. ナガミヒナゲシ

稀。分布：中部（安曇野市）-全国。由来：自然。原産地：地中海沿岸。渡来：昭和（戦後）。

P. hybridum L. トゲミゲシ, トゲミヒナゲシ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州, 九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

P. rhoeas L. ヒナゲシ, グビジンソウ, ノハラヒナゲシ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ, 西アジア, 北アジア。渡来：江戸時代。

P. somniferum L. ケシ

稀。分布：中部（松本市）。由来：逸出（薬用・観賞用）。原産地：ペルシャ, アラビア。渡来：古い。

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) アブラナ科 p.80

Alyssum alyssoides (L.) L. アレチナズナ

稀。分布：中部（松本市）-本州。由来：自然。原産

地：地中海沿岸地方〜中央アジア。渡来：昭和（戦後）。

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. シロイヌナズナ

稀。分布：北部（飯山市・長野市）・中部（松本市・安曇野市）-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア, 北アフリカ。渡来：昭和（戦後）。

Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. セイヨウワサビ, ワサビダイコン

普通。分布：全県-北海道, 本州（東北・中部）。由来：逸出（食用）。原産地：ヨーロッパ東部, ロシア南部。渡来：明治初年。

Barbarea vulgaris R. Br. ハルザキヤマガラシ, フユガラシ, セイヨウヤマガラシ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ, 西アジア, ヒマラヤ。渡来：明治末年ごろから植物園で栽培した。

Brassica juncea (L.) Cern. カラシナ, セイヨウカラシナ

稀。分布：中部（富士見町）-全国。由来：逸出（辛味料, 薬用）。原産地：ユーラシア。渡来：明治以前から栽培された。

B. napus L. セイヨウアブラナ

少。分布：東部・中部・南部-北海道, 本州, 九州。由来：逸出（菜種油用）。原産地：ユーラシア。渡来：明治初期。

B. nigra (L.) W. D. J. Koch クロガラシ

稀。中部（安曇野市）-全国。由来：逸出（種子は洋辛子の原料）。原産地：ヨーロッパ〜西アジア。

B. rapa L. var. *nippo-oleifera* Kitam. アブラナ, ニホンアブラナ

稀。分布：中部（上田市・安曇野市）-全国。由来：逸出（油脂原料）。原産地：原種は中国？。渡来：古い。

Camelina microcarpa Andr. ex DC. ヒメアマナズナ, ヒメタマナズナ

稀。分布：南部（阿南町）-北海道, 本州, 九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

Cardamine hirsuta L. ミチタネツケバナ

稀。分布：北部（小谷村）・中部（安曇野市）-北海道, 本州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Chorispora tenella (Pall.) DC. ツノミナズナ

稀。分布：中部（富士見町）-北海道〜四国。由来：自然。原産地：西アジア。渡来：昭和（戦後）。

Conringia orientalis (L.) Dumort. ナタネハタザオ, コパンガラシ

稀。分布：北部（小川村）-北海道～四国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：昭和。

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl クジラグサ

稀。分布：北部（長野市）・中部（安曇野市）・東部（佐久市）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ, 北アフリカ, 西アジア。渡来：江戸時代。

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. ロボウガラシ

稀。分布：中部（松本市）-北海道, 本州（群馬・神奈川県・長野・三重・岡山県）。由来：逸出。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

Erysimum cheiranthoides L. エゾスズシロ

稀。分布：東部（御代田町）・南部（伊那市）-北海道～四国。由来：自然。原産地：北半球の温帯。渡来：北海道では早くから知られ, 自生種として扱われることもある。

Lepidium campestre (L.) R. Br. ウロコナズナ

稀。分布：北部（長野市）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

L. densiflorum Schrad. ヒメグンバイナズナ

稀。分布：北部（飯山市）-北海道, 本州。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後らしい）。

L. draba L. アコウグンバイ, アコウグンバイナズナ, イヌグンバイナズナ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（中部以南）, 四国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：昭和（戦後）。

L. latifolium L. ベンケイナズナ, ヒロハヒメグンバイナズナ, ヒロハグンバイナズナ

稀。分布：中部（坂城町）-本州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ, 西アジア, 北アフリカ。渡来：昭和（戦後）。

L. perfoliatum L. コシミノナズナ

稀。分布：北部（長野市）・南部（木曽町）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ東部～西アジア。渡来：大正。

L. virginicum L. マメグンバイナズナ, セイヨウグンバイナズナ, コウベナズナ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期。

Nasturtium officinale R. Br. オランダガラシ, ミズガラシ, クレソン

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（食用）。原産

地：ヨーロッパ, 中央アジア。渡来：明治。江戸時代後期には栽培されていたらしい。

Orychophragmus violaceus O. E. Schulz ショカツサイ, ハナダイコン, オオアラセイトウ, シキンサイ

少。分布：北部・中部・南部-ほぼ全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：中国。渡来：江戸時代（宝永・正徳年間?）。

Rapistrum rugosum (L.) J. P. Bergeret ミヤガラシ

稀。分布：北部（須坂市）・東部（小諸市）-全国。由来：自然。原産地：地中海沿岸～黒海周辺。渡来：昭和。

Rorippa austriaca (Crantz) Bess. ミミイヌガラシ

少。分布：北部・中部-北海道, 本州（関東～近畿地方）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ東部～西南アジア。渡来：昭和（戦後）。

R. sylvestris (L.) Bess. キレハイスガラシ, ヤチイスガラシ

普通。分布：全県-北海道, 本州（中部以北）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Sinapis alba L. シロガラシ

稀。分布：東部（小諸市）・南部（宮田村）-北海道, 本州。由来：逸出（洋芥子の原料）。原産地：地中海沿岸。渡来：明治中期。

Sisymbrium altissimum L. ハタザオガラシ

稀。分布：東部（御代田町）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

S. officinale (L.) Scop. カキネガラシ

稀。分布：北部（飯山市）・中部（安曇野市）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

var. *leiocarpum* DC. ハマカキネガラシ

稀。分布：北部（白馬村）。

S. orientale L. イヌカキネガラシ

稀。分布：中部（松本市）・東部（小諸市）・南部（木曽町）-全国。由来：自然。原産地：地中海沿岸。渡来：大正。

Thlaspi arvense L. グンバイナズナ

少。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：江戸時代。

THEACEAE ツバキ科 なし

Camellia sinensis (L.) O. Kuntze チャノキ, チャ

稀。分布：中部（富士見町）・南部（南木曽町・天龍村）-本州（関東以西）, 四国, 九州。由来：逸出（製茶）。原産地：中国。渡来：仏僧最澄が805年に持

ち帰ったという。広く栽培されるようになったのは、
仏僧栄西が1191年に中国から持ち帰ってから。

CRASSULACEAE ベンケイソウ科 p.98

Sedum hispanicum L. ウスユキマンネングサ

稀。分布：中部（松本市）-北海道，本州（関東以北）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ中部～小アジア。渡来：大正。

S. mexicanum Britton メキシコマンネングサ

稀。分布：中部（松本市）-本州（関東以西）～九州。由来：逸出（観賞用）。原産地：不明（中国東部？）。渡来：昭和（戦後）。

S. sarmentosum Bunge ツルマンネングサ

少。分布：中部・東部-本州，四国，九州。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：朝鮮，中国。渡来：古い。

ROSACEAE バラ科 p.99

Potentilla norvegica L. エゾノミツモトソウ

稀。分布：北部（山ノ内町・木島平村）-北海道，本州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ～北アメリカ。渡来：明治。

P. recta L. タチロウゲ，オオヘビイチゴ

稀。分布：中部（松本市）-北海道，本州，九州。由来：逸出（観賞用）。原産地：南ヨーロッパ。渡来：明治中期。

P. supina L. オキジムシロ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）-本州，九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Prunus persica (L.) Batsch form. *subspontanea* Sugimoto
ノモモ，イシモモ

普通。分布：全県-本州，九州。由来：逸出（観賞用・果樹）。原産地：中国。渡来：有史以前。

form. sp. シロノモモ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）。

form. sp. ヤエノモモ

稀。分布：中部（松本市）。

P. salicina Lindl. スモモ

稀。分布：中部（安曇野市）。由来：逸出（食用，薬用）。原産地：中国。渡来：古い。

Rubus armeniacus Focke セイヨウヤブイチゴ

稀。分布：北部（飯山市）・東部（南相木村）-全国。由来：逸出（食用）。原産地：アルメニア。渡来：昭和初期？。

LEGUMINOSAE マメ科 p.102

Aeschynomene virginica (L.) Britton, Sterns et Poggenb.
アメリカクサネム

稀。分布：中部（筑北村・安曇野市）・東部（小諸市）-本州，琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。

Amorpha fruticosa L. イタチハギ，クロバナエンジュ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（鑑賞用，砂防用，生垣用）。原産地：アメリカ合衆国。渡来：大正初年。

Apois americana Medik. アメリカホドイモ

稀。分布：北部（飯綱町）-北海道，本州。由来：逸出（観賞用）。原産地：アメリカ合衆国東南部。渡来：明治中期。

Astragalus sinicus L. ゲンゲ，レンゲソウ

少。分布：北部・中部・南部-本州～九州。由来：逸出（水田の緑肥用，飼料用，薬用，食用）。原産地：中国長江流域。渡来：江戸時代以前。

form. *leucanthus* Nakai シロバナゲンゲ

稀。分布：北部（長野市）・中部（安曇野市）。

Cytisus scoparius (L.) Link エニシダ

稀。分布：北部・中部・南部-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ南部。渡来：延宝年間（1673～1681年）。

Desmodium paniculatum (L.) DC. アレチヌスビトハギ

稀。分布：中部（安曇野市）・南部（南木曾町・山口村・飯田市・平谷村）-北海道，本州（東北地方南部以西）～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ東南部。渡来：昭和。

Lathyrus latifolius L. ヒロハレンリソウ

稀。分布：中部（松本市）-北海道，本州。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl. オオバメドハギ

稀。分布：中部（坂城町）-本州，四国（愛媛県）。由来：自然。原産地：アジア（東部～東北部）。渡来：昭和。

L. inschanica (Maxim.) Schindl. カラメドハギ

普通。分布：全県-北海道～四国。由来：自然。原産地：中国，朝鮮。渡来：昭和。

Lotus corniculatus L. subsp. *corniculatus* セイヨウミヤコグサ

少。分布：北部（中野市）・中部（上田市・松本市・安曇野市）-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア，アフリカ。渡来：昭和（戦後）。

L. pedunculatus Cav. ネビキミヤコグサ

稀。分布：中部（諏訪市）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ，北アフリカ。渡来：昭和（戦後）。

Medicago lupulina L. コメツブウマゴヤシ

少。分布：北部・中部・南部-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパと考えられる。渡来：江戸時代。

M. minima (L.) Bartal. コウマゴヤシ

稀。分布：南部（辰野町・天龍村）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ，アフリカ，西アジア。渡来：明治。

M. polymorpha L. ウマゴヤシ，マゴヤシ，ムマゴヤシ

少。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：ヨーロッパ南部と地中海地方と考えられる。渡来：江戸時代初期。

M. sativa L. ムラサキウマゴヤシ，アルファルファ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：地中海地方～西アジア。渡来：明治初年。

form. sp. シロバナムラサキウマゴヤシ

稀。中部（松本市）。

Melilotus indicus (L.) All. コシナガワハギ

稀。分布：中部（松本市）・南部（松川町）-北海道，本州（東北南部以西）～琉球。由来：自然。原産地：地中海沿岸とヨーロッパ南西部。渡来：昭和。

M. officinalis (L.) Pall. subsp. *albus* (Medik.) H. Ohashi et Tateishi シロバナシナガワハギ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（飼料用）。原産地：アフリカ西～中央アジア。渡来：弘化2年（1845年）。

subsp. *suaveolens* (Ledeb.) H. Ohashi シナガワハギ，エビラハギ

少。分布：北部・中部・南部-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：江戸時代末期。

Robinia hispida L. ハナエンジュ，ハナアカシア，バラアカシア

稀。分布：中部（松本市）。由来：逸出。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期。

R. pseudoacacia L. ハリエンジュ，ニセアカシア

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（庭木，街路樹，砂防用）。原産地：アメリカ合衆国東南部と推定される。渡来：明治。

form. *inermis* (Mirb.) Rehd. トゲナシハリエンジュ，トゲナシニセアカシア

少。分布：中部・東部。

Senna obtusifolia L. エビスグサ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（関東以西）～琉球。由来：逸出（薬用）。原産地：熱帯アメリカとされる。渡来：享保年間（1716～1736年）。

Trifolium campestre Schreb. クスダマツメクサ，ホップツメクサ

普通。分布：中部・東部・南部-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ，アフリカ，西アジア。渡来：昭和。

T. dubium Sibth. コメツブツメクサ，コゴメツメクサ

少。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ，西アジア。渡来：昭和。

T. fragiferum L. ツメクサダマシ

稀。分布：中部（松本市）-北海道，本州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ，西アジア。渡来：昭和。

T. hybridum L. タチオランダゲンゲ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：ヨーロッパ，アフリカ，西アジア。渡来：明治。

T. pratense L. ムラサキツメクサ，アカツメクサ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：ヨーロッパ，アフリカ，西アジア。渡来：明治維新ころ。

form. *albiflorum* Alef. シロバナアカツメクサ

少。分布：全県。

T. repens L. シロツメクサ，クローバー，ツメクサ，オランダゲンゲ，オランダツメクサ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（詰め物）。原産地：ヨーロッパ，アフリカ，西アジア。渡来：弘化3年（1846年）。

form. *okuharae* F. Yokouchi, nom. nud. オクハラシロツメクサ

稀。分布：中部（松本市）-北海道（根室市），本州（長野県）。

form. *roseum* Peterm. モモイロシロツメクサ

少。分布：中部，南部。

Vicia villosa Roth subsp. *villosa* ビロードクサフジ

少。分布：北部・中部・南部-全国。由来：逸出（緑肥用）。原産地：ヨーロッパ，北アフリカ，西アジア。渡来：昭和。

subsp. *varia* (Host) Corb. ナヨクサフジ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（飼料用，緑肥用）。原産地：ヨーロッパ，西アジア。渡来：昭和。

Oxalis corymbosa L. ムラサキカタバミ, キキョウカタバミ

稀。分布：中部（松本市）・南部（飯田市）-ほぼ全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：南アメリカ。渡来：文久年間（1861～1864年）。

O. dillenii Jacq. オッタチカタバミ

普通。分布：中部（松本市・安曇野市）-本州～九州（北部）。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

GERANIACEAE フウロソウ科 p.127

Erodium cicutarium (L.) L'Hr subsp. *cutarium* オランダフウロ

稀。分布：中部（安曇野市）・南部（飯田市）-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ユーラシア。渡来：嘉永年間（1848～1854年）。

Geranium carolinianum L. アメリカフウロ

普通。分布：中部・南部-本州（宮城県以南）～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

LINACEAE アマ科 p.129

Linum medium (Planch.) Britton var. *medium* キバナノマツバニンジン, キバナノマツバナデシコ

稀。分布：中部（茅野市）-本州，四国，九州（鹿児島県）。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

EUPHORBIACEAE トウダイグサ科 p.130

Chamaesyce maculata (L.) Small コニシキソウ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ及び中央アメリカ。渡来：明治。

C. nutans (Lag.) Small オオニシキソウ

普通。分布：全県-本州～九州。由来：自然。原産地：北アメリカ及び中央アメリカ。渡来：明治。

SIMAROUACEAE ニガキ科 p.134

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ニワウルシ, シンジュ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（街路樹）。原産地：中国。渡来：明治。

ANACARDIACEAE ウルシ科 ない

Rhus verniciflua Stokes ウルシ

少。分布：全県-全国。由来：逸出（漆液）。原産

地：中国～ヒマラヤ。渡来：古い（7世紀末には栽培していたと言う）。

MALVACEAE アオイ科 p.135

Abelmoschus manihot (L.) Medik. トロロアオイ, ネリ

稀。分布：北部（飯山市）。由来：逸出（糊着剤，薬用，観賞用）。原産地：中国。渡来：不明（江戸時代に栽培の記録がある）。

Abutilon theophrasti (L.) Medic. イチビ, キリアサ, ゴザイバ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（繊維）。原産地：インド。渡来：古い。

Althaea armeniaca Ten. シチゴサンアオイ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）-本州（長野県）。由来：逸出（観賞用）。原産地：中央アジア，西南アジア。渡来：昭和（戦後）。参考：1985年6月30日に横内文人が松本城で日本初採集。杉本順一が同定し和名を新称した。

A. rosea (L.) Cav. Diss. タチアオイ, ハナアオイ

普通。分布：全県。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：小アジア。渡来：古い（万葉集に詠まれている）。
Anoda cristata (L.) D. F. K. Schltdl. ニシキアオイ, ミズイロアオイ

稀。分布：北部（長野市）・中部（安曇野市）。由来：逸出（園芸用）。原産地：北アメリカ中南部～南アメリカ北部。渡来：昭和初期。参考：1986年9月15日に横内文人が安曇野市で採集，杉本順一が同定しミズイロアオイの和名をつけた。

Hibiscus coccineus Walt. モミジアオイ

稀。分布：中部（大町市）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治末期。

H. syriacus L. ムクゲ, ハチス

普通。分布：全県。由来：逸出（生垣，繊維，薬用，根締め）。原産地：中国・朝鮮半島。渡来：古い（安土桃山時代ごろには茶花として用いた）。

H. trionum L. ギンセンカ, チョウロソウ

少。分布：全県-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：地中海沿岸。渡来：古い。参考：江戸時代の本草書に図説されている。

Malva moschata L. ジャコウアオイ

少。分布：北部・中部・南部-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治末期。

M. neglecta Wallr. ゼニバアオイ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：

ユーラシア。渡来：昭和。

M. parviflora L. ウサギアオイ, ハイアオイ

稀。分布：北部（長野市）・中部（富士見町）-本州（関東以西）～琉球。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

M. sylvestris L. var. *sylvestris* ウスベニアオイ

稀。分布：中部（松本市）-本州（中部以南）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ, 北アフリカ, 小アジア。渡来：昭和（戦後）。

var. *mauritiana* (L.) Obiss. ゼニアオイ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：地中海沿岸。渡来：江戸時代。

cv. *albiflora* シロバナゼニアオイ

稀。分布：北部（長野市）・中部（松本市）。

M. verticillata L. フユアオイ

少。分布：中部・南部-本州～琉球。由来：逸出（食用）。原産地：東アジア。渡来：古い（平安時代には記録がある）。

var. *crispa* Makino オカノリ

稀。分布：北部（長野市）・中部（富士見町）。由来：逸出（食用, 飼料, 薬用）。

Sida spinosa L. アメリカキンゴジカ

稀。分布：北部（長野市）-本州～九州。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

VIOLACEAE スミレ科 p.141

Viola odorata L. ニオイスマスミレ

少。分布：全県。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：地中海沿岸。渡来：明治中期。

V. sororia Willd. アメリカスミレサイシン

普通。分布：全県-北海道～四国。由来：逸出（観賞用, 実験用）。原産地：北アメリカ東部。渡来：明治以降。

BEGONIACEAE シュウカイドウ科 p.141

Begonia grandis Dryand. シュウカイドウ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（関東以西）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：中国南部～東南アジア。渡来：江戸時代（1620年ごろ）。

CUCURBITACEAE ウリ科 p.141

Citrullus colocynthis Schrad. コロシントソウ

稀。分布：北部（長野市）。由来：逸出（薬用）。原産地：アラビヤ, 北アフリカ, 小アジア。

Sicyos angulatus L. アレチウリ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Thladiantha dubia Bunge オオスズメウリ, キバナカラスウリ

稀。分布：東部（佐久市・小諸市）-北海道, 本州（福島・群馬・長野県）。由来：逸出（薬用）。原産地：中国北部, 朝鮮。渡来：昭和（戦後）。

LYTHRACEAE ミソハギ科 p.142

Ammannia coccinea Rottb. ホソバヒメミソハギ

少。分布：中部・東部・南部-本州（埼玉県以西）～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

ONAGRACEAE アカバナ科 p.143

Gaura lindheimeri Engelm. et A. Gray ヤマモモソウ

稀。分布：南部（駒ヶ根市）-本州（長野県, 四国（愛媛県））。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治。

G. parviflora Douglas コバナヤマモモソウ, イヌヤマモモソウ

稀。分布：北部（長野市）-本州（東京・長野・京都・岡山・広島（都府県）, 四国, 九州, 琉球（久米島））。由来：自然。原産地：アメリカ合衆国, メキシコ。渡来：大正。

Oenothera biennis L. メマツヨイグサ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ（合衆国中部～大西洋岸）。渡来：大正？。

O. × fallax Renner オオメマツヨイグサ（メマツヨイグサ × オオマツヨイグサ）

少。分布：中部（千曲市・松本市）。由来：自然。参考：1996年に間種として報告された。

O. glazioviana Micheli オオマツヨイグサ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（鑑賞用）。原産地・渡来：1870年ごろ, 間種起源（ヨーロッパ）。

O. jamesii Torr. et. A. Gray オニマツヨイグサ

稀。分布：中部（長和町）-本州（長野・福井・和歌山県, 京都府）, 九州。由来：自然。原産地：アメリカ合衆国中南部～メキシコ。渡来：昭和（戦後）。

O. laciniata Hill コマツヨイグサ, キレハマツヨイグサ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（関東以西）～九州。由来：自然。原産地：北アメリカ東部。渡来：大

正。

O. perennis L. ヒナマツヨイグサ

稀。分布：東部（小諸市・佐久市）-北海道，本州。
由来：逸出（鑑賞用）。原産地：北アメリカ東北部。
渡来：昭和（戦後）。

O. sp. アヅミノマツヨイグサ（仮称）

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（長野県）。学名・原産地等：未定。参考：2003年11月7日に横内文人が安曇野市で日本初採集し，和名を仮称した。

O. speciosa Nutt. ヒルザキツキシソウ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（長野・岐阜県など）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：北アメリカ合衆国（中部と東南部）～メキシコ。渡来：昭和（戦後）。

O. stricta Ledeb. ex Link マツヨイグサ

稀。分布：南部（飯田市）-本州，九州。由来：自然。原産地：南アメリカ（チリ，アルゼンチン）。渡来：嘉永年間（1848～1854年）。

O. tetraptera Cav. ツキシソウ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：北アメリカ（テキサス州南部～メキシコ）。渡来：江戸時代末期。

ARALIACEAE ウコギ科 p. なし

Eleutherococcus sieboldianus (Makino) Koidz. ヒメウコギ

少。分布：全県-本州（東北，長野県）。由来：逸出（食用，薬用）。原産地：中国。渡来：古い。

PRIMULACEAE サクラソウ科 p. 155

Lysimachia nummularia L. コバンコナスビ，コバンバコナスビ，ヨウシュコナスビ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市・富士見町）-北海道，本州（埼玉・神奈川・長野・岡山県）。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

APOCYNACEAE キョウチクトウ科 p. 156

Vinca major L. ツルニチニチソウ

少。分布：中部。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：南ヨーロッパ，北アフリカ。渡来：明治。

form. *elegantissima* Hort. フクリンツルニチニチソウ

稀。分布：中部（安曇野市）。

V. rosea L. ニチニチソウ

少。分布：中部。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：熱帯アメリカ。渡来：江戸時代。

RUBIACEAE アカネ科 p. 157

Sherardia arvensis L. ハナヤエムグラ，アカバナムグラ，アカバナヤエムグラ

稀。分布：中部（安曇野市）-北海道，本州（宮城県以西）～四国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

CONVOLVULACEAE ヒルガオ科 p. 160

Calystegia pellita (Ledeb.) G. Don タチヒルガオ

少。分布：中部（松本市・安曇野市・富士見町）・南部（伊那市）-本州（長野県）。由来：自然。原産地：中国。渡来：昭和（戦後）。参考：横内文人が松本市（1976年6月15日-日本初），富士見町（1983年7月1日）で採集し，高橋秀男が同定した。

Convolvulus arvensis L. セイヨウヒルガオ，ヒメヒルガオ

少。分布：北部・中部・東部-全国。由来：逸出（戦前のものは観賞用）・自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：婦化は昭和（戦後）。

Cuscuta pentagona Engelm. アメリカネナシカズラ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Ipomoea lacunosa L. マメアサガオ

稀。分布：北部（長野市）・中部（安曇野市）・南部（飯田市）-本州（関東地方以西）～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Jacquemontia tamnifolia (L.) Griesb. オキナアサガオ

稀。分布：北部（長野市）-本州（関東以西），九州，琉球。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Pharbitis hederacea (L.) Choisy アメリカアサガオ

稀。分布：中部（松本市）-本州（関東地方以西）～琉球。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

var. *integriscula* A.Gray マルバアメリカアサガオ

稀。分布：南部（平谷村）。

P. purpurea (L.) Voigt マルバアサガオ，カキネアサガオ

普通。分布：全県-本州（関東以西）～琉球。由来：逸出（観賞用）。原産地：熱帯アメリカ。渡来：宝永年間（1704～1711年）の栽培記録がある。

Quamoclit coccinea (L.) Moench マルバルコウソウ,
ルコウアサガオ

普通。分布：全県-本州（中部以西）～琉球。由
来：逸出（観賞用）。原産地：熱帯アメリカ。渡来：
嘉永年間（1848～1854年）。

BORAGINACEAE ムラサキ科 p.164

Amsinckia lycopsoides Lehm. ワルタビラコ

稀。分布：東部（小諸市）-北海道（釧路）～四国。
由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦
後）。

Lithospermum arvense L. イヌムラサキ

少。分布：全県-本州，四国，九州。由来：自然。
原産地：北半球の温帯。渡来：昭和（戦後）。参考：
自生と帰化がある。

L. officinale L. セイヨウムラサキ

稀。分布：中部（松本市）-本州（東京都，山梨・長
野県）。由来：逸出（染料）。原産地：ヨーロッパ。渡
来：昭和（戦後）。

Myosotis arvensis (L.) Hill. ノハラムラサキ

稀。分布：東部（川上村）-北海道，本州。由来：自
然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

M. scorpioides L. ワスレナグサ，シンワスレナグサ

普通。分布：全県-北海道，本州（中部地方以北），
四国。由来：逸出（観賞用）。原産地：ヨーロッパ。
渡来：昭和（戦後）。

Symphytum × uplandicum Nyman コンフリー（ヒレ
ハリソウ × オオハリソウ）

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（食用・薬
用・牧草）。原産地：間種起源。渡来：昭和（戦後）。

form. sp. シロバナコンフリー

稀。分布：中部（松本市・安曇野市・富士見町）。

VERBENACEAE クマツヅラ科 p.168

Verbena bonariensis L. ヤナギハナガサ，サンジャク
バーベナ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）-全国。由来：
逸出（観賞用）。原産地：南アメリカ。渡来：昭和
（戦後）。

V. brasiliensis Vell. アレチハナガサ

稀。分布：中部（松本市・岡谷市）-本州（関東以
西）～琉球。由来：自然。原産地：南アメリカ。渡
来：昭和（戦後）。

V. tenera Spreng. ヒメビジョザクラ

稀。分布：中部（松本市）・東部（川上村）。由来：
逸出（観賞用）。原産地：南アメリカ。

LABIATAE (LAMIACEAE) シソ科 p.170

Ajuga reptans L. セイヨウキランソウ，セイヨウジュ
ウニヒトエ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州。由来：逸出（観
賞用）。原産地：北ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Calamintha ascendens Jord. イギリスフツウハッカ
（新称）

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（長野県）。由
来：自然。原産地：ヨーロッパ（イギリス）。渡来：
平成。参考：2005年8月17日に横内文人が日本初採集。
清水建美が同定し和名を新称した。

Lamium purpureum L. ヒメオドリコソウ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：
ヨーロッパ。渡来：明治。

form. *albiflorum* Goir シロバナヒメオドリコソウ

稀。分布：北部（長野市）・中部（松本市・安曇野
市）。

Mentha longifolia (L.) Huds. ナガバハッカ，ケハッカ

稀。分布：北部（中野市）・中部（松本市）-本州
（関東以西），四国（愛媛県），九州。由来：自然。原
産地：ユーラシア。渡来：昭和。

M. piperita L. コショウハッカ，セイヨウハッカ

稀。分布：北部（飯山市・中野市）・中部（松本
市・朝日村）-ほぼ全国。由来：逸出（香辛料）。原産
地：ヨーロッパ。渡来：明治。

M. spicata L. オランダハッカ，ミドリハッカ

稀。分布：北部（長野市）・中部（松本市・上田
市・東御市）-ほぼ全国。由来：逸出（料理用）。原産
地：ヨーロッパ。渡来：江戸時代。

Nepeta cataria L. イヌハッカ，チクマハッカ

少。分布：北部・中部・東部-本州（岩手・山形・
群馬・千葉・長野県など）。由来：逸出（薬用）。原産
地：ユーラシア。渡来：昭和（戦後）。参考：自生も
あると言う。

Perilla frutescens Britt. var. *japonica* Hara エゴマ

稀。分布：北部（長野市）。由来：逸出（油脂，食
用）。原産地：中国，台湾，インド，ヒマラヤ地方。

var. *acuta* Kudo シソ

少。分布：全県。由来：逸出（食用）。原産地：中
国～ヒマラヤ地方。

form. *viridis* Kudo アオジソ

稀。分布：全県。

Physostegia virginiana (L.) Benth. ハナトラノオ、カクトラノオ

少。分布：全県。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：大正。

BIGNONIACEAE ノウゼンカズラ科 p. なし

Catalpa ovata C. Don キササゲ

普通。分布：全県。由来：逸出（庭木、果を薬用）。原産地：中国。

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. キリ

普通。分布：全県-本州～九州。由来：逸出（家具・下駄等、薬用）。原産地：中国中部。渡来：古い。

SOLANACEAE ナス科 p.175

Datura innoxia Mill. ケチウセンアサガオ、アメリカチウセンアサガオ

少。分布：中部・東部。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治以後。参考：麻酔用としては江戸時代に渡来。

D. stramonium L. ヨウシュチウセンアサガオ

少。分布：全県-全国。由来：逸出（薬用、観賞用）。原産地：熱帯アメリカ。渡来：明治初期。

Nicandra physalodes (L.) Pers. オオセンナリ

少。分布：中部・東部-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：南アメリカ。渡来：江戸時代末期。

Nierembergia repens Ruiz. et Pav. ヒルガオモドキ、ギンサカズキ、ギンバイソウ

稀。分布：中部（富士見町）。由来：逸出（観賞用）。原産地：南アメリカ。

Physalis acutifolia (Miers) Sandow フウリンホオズキ、ナガエノセンナリホオズキ

稀。分布：南部（山口村）-本州（関東以西）～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

P. alkekengi L. var. *franchetii* (Mast.) Makino ホオズキ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（薬用、観賞用）。原産地：中国。渡来：古い。

P. angulata L. センナリホオズキ、ヒロハフウリンホオズキ

少。分布：北部・中部・南部-本州～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：「本草図譜」に出ている。

P. pubescens L. var. *grisea* Waterfall ショクヨウホオズ

キ、ケセンナリホオズキ

稀。分布：北部（長野市）・中部（松本市・富士見町）-暖地。由来：逸出（食用）。原産地：北アメリカ。渡来：不明。

P. subglabrata Mack. et Bush ウスゲホオズキ

稀。分布：中部（生坂村）-本州（千葉・神奈川・長野県）、四国（香川県）。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。参考：2005年10月3日に横内文人が採集し、清水建美が同定した。

Solanum americanum Mill. アメリカイヌホオズキ

少。分布：全県-本州（関東南部以西）～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。
S. carolinense L. ワルナスビ、オニナスビ、ノハラナスビ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：明治末期。

form. *albiflorum* Benk. シロバナワルナスビ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）。

S. ciliatum Lam. キンギンナスビ、ニシキハリナスビ

稀。分布：北部（長野市）-本州（関東南部以西）～琉球。由来：逸出（観賞用）。原産地：熱帯アメリカ。渡来：明治初期。

S. sarachioides Sendtner ケイヌホオズキ

稀。分布：中部（御代田町）-本州（千葉・神奈川・長野県）、九州（福岡県）。由来：自然。原産地：南アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

BUDDLEJACEAE フジウツギ科 なし

Buddleja davidii Franch. フサフジウツギ、チチブフジウツギ

少。分布：中部・東部・南部-本州。由来：逸出（観賞用）。原産地：中国。渡来：明治中期。参考：伊那市（長谷）・大鹿村等の石灰岩地の生育は、自生と考えられている。

SCROPHULARIACEAE ゴマノハグサ科 p.184

Digitalis purpurea L. ジギタリス、キツネノテブクロ

稀。分布：南部（飯島町・阿智村）。由来：逸出（薬用、観賞用）。原産地：南ヨーロッパ、モロッコ。渡来：明治中期。

Linaria canadensis (L.) Dumont マツバウンラン

稀。分布：中部（諏訪市）・南部（阿智村）-本州（関東以西～瀬戸内海沿岸）。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

L. genistifolia (L.) Miller subsp. *dalmatica* (L.) Maire et Petitomenon キバナウンラン

稀。分布：中部（松本市）・南部（飯田市）-北海道，本州。由来：逸出（観賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：大正末期。

L. vulgaris Hill ホソバウンラン，セイヨウウンラン

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）・南部（南木曾町）-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：ユーラシア。渡来：大正初年。

Lindernia dubia (L.) Pennell subsp. *majar* (Pursh) Pennell アメリカアゼナ

普通。分布：中部・南部-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

Mimulus × hybridus Wettst. ニシキミゾホオズキモドキ (*M. luteus* × *M. guttatus*)

稀。分布：北部（山ノ内町）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。

Verbascum blattaria L. モウズイカ

稀。分布：北部（長野市）・中部（松本市）・東部（小諸市）・南部（木祖村）-北海道，本州。由来：逸出（観賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

form. *albiflora* (Don) House シロバナモウズイカ，エサシソウ

稀。分布：中部（松本市）。

V. thapsus L. ビロードモウズイカ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

Veronica arvensis L. タチイヌノフグリ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初期。

V. hederifolia L. フラサバソウ，ツタノハインノフグリ

稀。北部（小布施町）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

V. persica Poiret オオイヌノフグリ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：西アジア。渡来：明治。

form. *alba* Durand. シロバナオオイヌノフグリ

稀。分布：中部（安曇野市）。

V. serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia* コテングクワガタ

少。分布：中部・東部-本州（群馬・神奈川・長野・三重県）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

PLANTAGINACEAE オオバコ科 p.193

Plantago lanceolata L. ヘラオオバコ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：江戸時代末期。

form. *composita* Farwell エダウチヘラオオバコ

稀。分布：中部（安曇野市）。

P. major L. セイヨウオオバコ，オニオオバコ

稀。分布：中部（松本市）-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

VALERIANACEAE オミナエシ科 p.195

Valerianella olitoria (L.) Poll. ノヂシャ

普通。分布：全県-本州～九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

CAMPANULACEAE キキョウ科 p.196

Lobelia inflata L. ロベリアソウ，セイヨウミゾカクシ

稀。分布：東部（佐久市）-本州（関東～近畿）。由来：逸出（園芸用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治。

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. キキョウソウ，ダンダンキキョウ

稀。分布：中部（松本市）・南部（売木村）-本州（宮城県以南）～九州。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期。

COMPOSITAE (ASTERACEAE) キク科 p.197

Achillea millefolium L. セイヨウノコギリソウ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：ヨーロッパ，コーカサス，イラン，シベリア，ヒマラヤ。渡来：明治中期。

A. stricta (W. D. J. Koch) Schleich. ex Gremli セイヨウノコギリソウモドキ

稀。分布：南部（売木村）-開港地や本州の中部以北。原産地：ヨーロッパ。

Ambrosia artemisiifolia L. ブタクサ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：明治初期。

A. trifida L. オオブタクサ，クワモドキ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

form. *integrifolia* Fern. マルバクワモドキ

稀。分布：南部（喬木村）。

Anthemis arvensis L. キゾメカミツレ, アレチカミツレ

稀。分布：中部（茅野市）-北海道，本州。由来：自然。原産地：地中海沿岸，コーカサス，イラン。渡来：明治初年。

A. cotula L. カミツレモドキ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ，北アフリカ，コーカサス，イラン，イラク。渡来：昭和。

Arctium lappa L. ゴボウ，ノラゴボウ，ニゲダシゴボウ

稀。分布：中部（松本市）・東部（小諸市）-北海道，本州。由来：逸出（食用）。原産地：ヨーロッパ，シベリア，中国東北部。渡来：古い。

Artemisia annua L. クソニンジン，ホソバニンジン

少。分布：北部・中部・東部-全国。由来：逸出（薬用）。原産地：ヨーロッパ南東部。渡来：古い。

A. sieversiana Willd. ハイイロヨモギ

稀。分布：中部（上田市）・東部（小諸市）・南部（木祖村）-本州（埼玉・長野県，京都府）。由来：自然。原産地：ヒマラヤ，モンゴル，シベリア，中国，朝鮮。渡来：昭和（戦後）。

Aster novae-angliae L. ネバリノギク

稀。分布：東部（小諸市）-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：大正。

A. pilosus Willd. キダチコンギク

稀。分布：南部（根羽村）-本州（関東以西），九州。由来：自然・逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

A. subulatus Michx. var. *sandwicensis* (A. Gray) A. G. Jones ホウキギク，アレチシオン，ハハキシオン，ホウキシオン

稀。分布：北部（長野市）・中部（安曇野市）・東部（川上村）-本州～琉球，小笠原。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：明治末期。

var. *ligulatus* Shinnars ヒロハホウキギク

少。分布：中部・南部-本州（関東以西）～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Bidens bipinnata L. コバノセンダングサ

少。分布：全県-本州～九州。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和初期。

B. frondosa L. アメリカセンダングサ，セイタカタウコギ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：大正。

B. parviflora Willd. ホソバノセンダングサ

少。分布：全県-本州（関東以西），九州。由来：自然。原産地：東アジア。渡来：江戸時代末期。

B. pilosa L. var. *pilosa* コセンダングサ

普通。分布：中部・東部・南部-本州～琉球。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：明治末期ごろ。

var. *minor* (Blume) Sherff コシロノセンダングサ，シロバナセンダングサ，シロノセンダングサ

稀。分布：中部（安曇野市・下諏訪町）・南部（天龍村）-本州（中部以西）。由来：自然。原産地：世界の熱帯～暖帯。渡来：弘化年間（1844～1848年）。

Calendula arvensis L. ヒメキンセンカ

稀。分布：南部（阿智村）。由来：逸出（薬用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：江戸時代末期。

Carduus crispus (Tourn.) L. ヒレアザミ，ヤハズアザミ

普通。分布：全県-本州～九州。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：古い。

form. *alba* H. H. ara シロバナヒレアザミ

少。分布：全県。

Carthamus tinctorius L. ベニバナ，セイヨウベニバナ

稀。分布：北部（長野市）。由来：逸出（染料，油料採取，薬用，観賞用）。原産地：エジプト，エチオピアあるいはアラビアと言われる。渡来：古い。

Centaurea cyanus L. ヤグルマギク

普通。分布：全県。由来：逸出（観賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

C. jacea L. ヤグルマアザミ

稀。分布：南部（高森町）-北海道，本州。由来：逸出（鑑賞用）。原産地：ヨーロッパ南部。渡来：明治末期。

Chamaemelum nobile (L.) All. ローマカミツレ，カモミール

稀。分布：中部（松本市）-本州（群馬・茨城・長野県），九州（長崎県）。由来：逸出（観賞用，お茶）。原産地：西ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Cichorium intybus L. キクニガナ，チコリー

稀。分布：中部（松本市）・東部（御代田町）-北海道，本州，九州。由来：逸出（食用，観賞用）。原産地：中部及び南部ヨーロッパ。渡来：明治。

Cirsium vulgare (Savi) Tenore アメリカオニアザミ，

セイヨウオニサザミ

少。分布：中部（松本市・安曇野市）-北海道～四国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Conyza bonariensis (L.) Cronq. アレチノギク、ノジョウギク

稀。分布：南部（飯田市）-全国。由来：自然。原産地：南アメリカ。渡来：明治。

C. canadensis (L.) Cronq. ヒメムカシヨモギ、カングンソウ、ゴイシツギサ、サイゴウソウ、テツドウグサ、メイジソウ、ヨガワリグサ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：明治初期。

C. parva Cronq. ケナシヒメムカシヨモギ

稀。分布：南部（南木曾町）-本州～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和初期。

C. sumatrensis (Retz.) E. H. Walker オオアレチノギク

普通。分布：全県-本州～琉球，小笠原。由来：自然。原産地：南アメリカ。渡来：大正。

Coreopsis drummondii Torr. et Gray キンケイギク

稀。分布：南部（高森町）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治初期。

C. lanceolata L. オオキンケイギク

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期。

C. tinctoria Nutt. ハルシャギク、ジャノメギク

稀。分布：北部（長野市）・中部（安曇野市）-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ西部。渡来：明治初期。

Cosmos bipinnatus Cav. コスモス、アキザクラ

普通。分布：全県。由来：逸出（観賞用）。原産地：メキシコ。渡来：明治12年と言われる。

C. sulphureus Cav. キバナコスモス

稀。分布：北部（長野市）。由来：逸出（観賞用）。原産地：メキシコ。渡来：大正初期。

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore ベニバナボロギク

少。分布：全県-本州～九州。由来：自然。原産地：熱帯アフリカ。渡来：昭和（戦後）。

Crepis setosa Haller f. アレチニガナ

稀。分布：東部（南牧村）-本州（関東以西），四国（徳島県）。由来：自然。原産地：南及び中央ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

C. tectorum L. ヤネタビラコ

少。分布：東部・南部-北海道～四国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Eclipta alba (L.) Hassk. アメリカタカサブロウ

稀。分布：中部（坂城町）・東部（佐久市）-本州（関東以西）。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. ダントボロギク

少。分布：全県-本州～琉球。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

Erigeron annuus (L.) Pers. ヒメジョオン、アメリカグサ、イヌヨメナ、サイゴウグサ、センソウグサ、ヤナギバヒメギク

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：江戸時代末期。

form. *purpureus* Asai ムラサキヒメジョオン

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）。

E. philadelphicus L. ハルジオン、ハルシオン、ベニバナヒメジョオン

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：大正中期。

form. *purpureus* Farwell ベニバナハルジオン

稀。分布：中部（松本市・安曇野市）。

E. strigosus Muhl. ex Willd. ヘラバヒメジョオン

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：大正。

Eupatorium japonicum Thunb. フジバカマ

少。分布：全県-本州（関東以西）～九州。由来：逸出（観賞用）。原産地：東アジア。渡来：奈良時代。参考：自生説もある。

E. rugosum Houtt. マルバフジバカマ

稀。分布：中部（上田市）・東部（小諸市）-北海道，本州（関東周辺に多い）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治。

Galinsoga parviflora Cav. コゴメギク

少。分布：全県-本州，四国。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和初期と推定される。

G. quadriradiata Ruiz et Pav. ハキダメギク

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和初期。

Gnaphalium pensylvanicum Willd. チチコグサモドキ

稀。分布：中部（松本市・安曇野市・富士見町）・南部（山口村・阿智村）-本州～九州。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：大正初期。

Helenium autumnale L. ダンゴギク

稀。分布：中部（塩尻市）・南部（辰野町）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：大正。

Helianthus annuus L. ヒマワリ

稀。分布：中部（安曇野市）・南部（高森町）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ中西部。渡来：17世紀。

H. cucumerifolius Torr. et Gray ヒメヒマワリ

稀。分布：中部（松本市）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治末ごろ。

H. strumosus L. イヌキクイモ

少。分布：北部・中部・南部-本州（千葉・神奈川・長野県）。由来：逸出（飼料）。原産地：北アメリカ。

H. tuberosus L. キクイモ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（食用，飼料，観賞用）。原産地：北アメリカ中部。渡来：安政6年（1859年）。

Heliopsis helianthoides (L.) Sweet キクイモモドキ

稀。分布：中部（松本市・岡谷市）・東部（小諸市・南相木村）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期ごろ。

Hieracium aurantiacum L. コウリンタンポポ，エフデギク

稀。分布：中部（上田市・松本市・安曇野市）-北海道，本州（岩手・宮城・福島・栃木・長野・滋賀・鳥取県），四国（愛媛県）。由来：逸出（観賞用）。原産地：北及び中部ヨーロッパ。渡来：明治中期。

H. maculatum Sm. ウズラバタンポポ

稀。分布：中部（岡谷市）。原産地：ヨーロッパ。

Hypochoeris radicata L. ブタナ，タンポポモドキ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ（北東部を除く）。渡来：昭和。

Lactuca indica L. var. *dracoglossa* (Makino) Kitam. リュウゼツサイ

稀。分布：中部（坂城町）・南部（高森町）。由来：逸出（飼料）。原産地：台湾。渡来：明治初年。

L. scariola L. トゲチシャ，アレチチシャ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ（ノルウェー，フィンランドなど北部を除く）。渡来：昭和（戦後）。

form. *integrifolia* G. Beck. マルバトゲチシャ

普通。分布：全県。

Lapsana communis L. ナタネタピラコ

稀。分布：中部（松本市）-北海道，本州（神奈川・

長野・岐阜・静岡・三重県）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

Leucanthemum vulgare Lam. フランスギク，マーガレット

普通。分布：全県-北海道，本州。由来：逸出（観賞用）。原産地：ヨーロッパの温帯地域。渡来：江戸時代末期。

Matricaria matricarioides (Less.) Porter コシカギク，オロシャギク

少。分布：中部・東部・南部-北海道～四国。由来：自然。原産地：アジア東北部と推定される。渡来：昭和（戦後）。

M. perforata Merat イヌカミツレ，イヌカミルレ

稀。分布：北部・中部・東部-北海道，本州，琉球。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治中期。

Rudbeckia hirta L. var. *pulcherrima* Farwell アラゲハンゴンソウ，キスガサギク

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

R. laciniata L. オオハンゴンソウ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期。

var. *hortensis* Bailey ハナガサギク，ヤエザキハンゴンソウ

少。分布：全県。

R. triloba L. ミツバオオハンゴンソウ

稀。分布：中部（松本市）-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：昭和初期。

Senecio jacobaea L. ヤブボロギク，ヤコブコウリンギク，ヤコブボロギク

稀。分布：東部（南牧村）-本州（長野県）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

S. vulgaris L. ノボロギク

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ，セイタカアキノキリンソウ，ヘイザンソウ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治。

S. gigantea Aiton var. *leiophylla* Fern. オオアワダチソウ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期。

Sonchus asper (L.) Hill オニノゲシ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. アカミタンポポ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：大正。

T. officinale Weber セイヨウタンポポ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

Tragopogon porrifolius L. バラモンジン, ムギナデシコ, セイヨウゴボウ

普通。分布：全県-本州（山形・埼玉・長野・岐阜・岡山県）, 四国（香川・愛媛県）。由来：逸出（食用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：江戸時代末期あるいは明治初年。

T. pratensis L. バラモンギク, キバナムギナデシコ, キバナザキバラモンジン

稀。分布：中部（松本市・安曇野市・塩尻市）・東部（小諸市）-北海道, 本州（東京都, 長野・岡山県）。由来：逸出（食用・観賞用）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

Tussilago farfara L. フキタンポポ, カントウ

稀。分布：中部（安曇野市）-北海道, 本州（長野県）。由来：逸出（観賞用）。原産地：ユーラシア。渡来：昭和（戦後）。参考：1995年4月11日に横内文人が本州初採集し, 清水建美が同定した。

Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Kearney ハチミツソウ, ハネミギク

少。分布：中部・東部・南部-全国。由来：逸出（蜜源植物）。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Xanthium italicum Moretti イガオナモミ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

X. occidentale Bertol. オオオナモミ

少。分布：中部・東部・南部-全国。由来：自然。原産地：メキシコ。渡来：昭和初期。

HYDROCHARITACEAE トチカガミ科 p.236

Egeria densa Planch. オオカナダモ

稀。分布：中部（松本市・諏訪市）・南部（伊那市）-本州（東北, 関東以南）~九州。由来：逸出（実験植物）。原産地：南アメリカ。渡来：昭和。

Elodea nuttallii (Planch.) St. John コカナダモ

普通。分布：全県-北海道, 本州（東北以南）~九

州。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

LILIACEAE ユリ科 p.237

Lycoris radiata Herb. ヒガンバナ, マンジュシャゲ

普通。分布：北部・中部・南部-本州, 四国, 九州。由来：自然・逸出（観賞用ほか）。原産地：中国。渡来：古い。参考：史前帰化植物として扱われることもある。

L. squamigera Maxim. ナツズイセン

少。分布：中部・東部・南部-本州, 四国, 九州。由来：逸出（観賞用ほか）。原産地：朝鮮, 中国。渡来：古い。参考：史前帰化植物として扱われることもある。

IRIDACEAE アヤメ科 p.239

Iris pseudacorus L. キショウブ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（花卉）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治中期ごろ。

cv. *Albiflora* シロバナキショウブ

稀。分布：中部（安曇野市）。参考：2003年6月2日に横内文人が日本初採集。

cv. *Pallida* ウスギイロキショウブ

稀。分布：中部（安曇野市）・南部（辰野町）。

Sisyrinchium atlanticum Bicknell ニワゼキショウ

稀。分布：南部（飯田市）-本州（東北南部以南）, 四国, 九州。由来：逸出（観賞用）。原産地：北アメリカ。渡来：明治中期。

S. mucronatum Michx. ヒトフサニワゼキショウ

稀。分布：東部（南牧村）-北海道, 本州。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Tritonia × crocosmaeflora Lemoine ヒメヒオウギズイン（ヒオウギズイセン × ヒメトウショウブ）

稀。分布：北部（白馬村）。由来：逸出（観賞用）。原産地：南アフリカ。渡来：明治中期。

JUNCACEAE イグサ科 p.240

Juncus tenuis Willd var. *williamsii* Fernald ナギナタクサイ

稀。分布：東部（佐久市）。渡来：昭和。

POACEAE (GRAMINEAE) イネ科 p.242

Aegilops cylindrica Host ヤギムギ

稀。分布：北部（長野市）-本州（宮城・群馬・長

野・兵庫・岡山県)。由来：自然。原産地：ヨーロッパ, 中東。渡来：昭和(戦後)。

A. triuncialis L. タルホコムギ

稀。分布：北部(長野市)-本州。由来：逸出(実験用)。原産地：南ヨーロッパ-中央アジア。

Agrostis × dimorpholemma Ohwi バケヌカボ(イベリアヌカボ×イトコスカグサ)

少。分布：中部・南部-本州(青森・宮城・福島・千葉・神奈川・静岡・長野県), 四国(愛媛県), 九州(福岡・大分県)。由来：逸出(のり面緑化)。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

A. gigantea Roth コスカグサ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出(牧草)。原産地：北半球の温帯。渡来：明治初期。

A. nigra With. クロコスカグサ

普通。分布：中部, 南部-本州, 四国, 九州。由来：自然。原産地：ユーラシア。

A. stolonifera L. ハイコスカグサ, タマガワヌカボ, ハマヌカボ, オオヌカボ

少。分布：北部・中部-全国。由来：逸出(のり面緑化)。原産地：北半球温帯北部。渡来：明治。

Aira caryophylla L. スカススキ

稀。分布：南部(阿智村)-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ, 北アフリカ, 西アジア。渡来：明治維新後。

Alopecurus pratensis L. オオスズメノテッポウ, ヨウシュセトガヤ

少。分布：中部・東部-全国。由来：逸出(牧草)。原産地：ヨーロッパ~西アジア。渡来：明治初期。

Andropogon virginicus L. メリケンカルカヤ

少。分布：南部(南木曽町・山口村・天龍村)-本州~九州。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

Anthoxanthum odoratum L. ハルガヤ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出(牧草, のり面緑化)。原産地：ユーラシア。渡来：明治初期。

Apera interrupta (L.) P. Beauv. ホソセイヨウヌカボ

稀。分布：北部(長野市)-本州(宮城・神奈川・富山・長野・岡山県)。由来：自然。原産地：ヨーロッパ中部~西アジア。渡来：昭和(戦後)。

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl オオカニツリ

少。分布：中部・東部・南部-全国。由来：逸出(牧草)。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

Avena sativa L. マカラスムギ, オートムギ, エンバク

稀。分布：中部(安曇野市)・東部(南牧村・川上村)・南部(上松町・大桑村)-全国。由来：逸出(牧草, 飼料用)。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

Briza maxima L. コバンソウ

少。分布：北部・中部・南部-本州~九州の主として沿岸地域。由来：逸出(観賞用)。原産地：地中海地方。渡来：明治初期。

B. minor L. ヒメコバンソウ, スズガヤ, ユレクサ

稀。分布：北部(中野市・山ノ内町)-本州~琉球。由来：自然。原産地：地中海地方。渡来：江戸時代末期。

Bromus briziformis Fisch. et C. A. Mey. ニセコバンソウ

稀。分布：中部(松本市・波田町)-本州(長野県), 九州(宮崎県)。由来：自然。原産地：中央アジア~小アジア。渡来：昭和(戦後)。参考：1975年に松本市で日本初採集。

B. carinatus Hook. et Arn. ヤクナガイヌムギ

稀。分布：中部(松本市・塩尻市)-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

B. catharticus Vahl イヌムギ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出(牧草)。原産地：南アメリカ。渡来：明治。

B. commutatus Schrad. ムクゲチャヒキ

少。分布：中部・南部-北海道, 本州, 九州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和(戦後)。

B. diandrus Roth ヒゲナガスズメノチャヒキ, オオスズメノチャヒキ, オオキツネガヤ

少。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：大正。

B. inermis J. Leyss. コスズメノチャヒキ, エゾチャヒキ, マンシュウチャヒキ, イヌムギモドキ

稀。分布：中部(諏訪市)-北海道, 本州~九州。由来：逸出(牧草)。原産地：ヨーロッパ~シベリア。渡来：昭和。

B. molliformis J. Lloyd ex Godr. ハトノチャヒキ, カモメノチャヒキ

稀。分布：中部(諏訪市)-北海道, 本州。由来：自然。原産地：南ヨーロッパ。渡来：昭和(戦後)。

B. secalinus L. カラスノチャヒキ

稀。分布：北部(長野市)・東部(佐久市)-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：明治。

B. sterilis L. アレチノチャヒキ, ニセキツネガヤ

稀。分布：北部(長野市)・東部(佐久市)-全国。

由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：大正。

B. tectorum L. var. *tectorum* ウマノチャヒキ, ヤセチャヒキ, ヒゲナガチャヒキ

普通。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald ヒメクリノイガ, ヒメクリノイガモドキ, メリケンクリノイガ

稀。分布：中部（諏訪市）-北海道（伊達市），本州（宮城・新潟・神奈川・静岡・長野・三重・兵庫県）。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

Chloris gayana Kunth アフリカヒゲシバ, ローズソウ
稀。分布：東部（佐久市）-本州（関東以西）~九州。
由来：逸出（牧草）。原産地：アフリカ。渡来：昭和（戦後）。

Cynosurus echinatus L. ヒゲガヤ

稀。分布：南部（駒ヶ根市）-北海道，本州，九州。
由来：自然。原産地：地中海地方。渡来：昭和（戦後）。

Dactylis glomerata L. カモガヤ, オーチャードグラス
普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：ヨーロッパ~西アジア。渡来：文久年間（1861~1864年）。

Elymus repens (L.) Gould シバムギ, ヒメカモジグサ
少。分布：全県-北海道，本州。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

var. *aristatus* Baumg. ノゲシバムギ

稀。分布：北部（長野市）。

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees シナダレスズメガヤ, セイタカカゼクサ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（のり面緑化）。原産地：南アフリカ。渡来：昭和（戦後）。

E. minor Host コスズメガヤ

少。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：明治。

Festuca arundinacea Schreb. オニウシノケグサ, トールフェスク

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（砂防，のり面緑化，牧草）。原産地：ヨーロッパ~西アジア。渡来：明治。

F. heterophylla Lam. ハガワリトボシガラ

稀。分布：中部（安曇野市・茅野市・原村・富士見町）-本州，四国。由来：逸出（砂防，のり面緑化）。原産地：ヨーロッパ中南部~西アジア。

F. pratensis Huds. ヒロハノウシノケグサ, メドウ

フェスク

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

F. rubra L. オオウシノケグサ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（砂防，のり面緑化）。原産地：ヨーロッパ。

var. *musashiensis* (Honda) Ohwi アサカワソウ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州（東京都，長野県）。由来：逸出（芝草）。

Holcus lanatus L. シラゲガヤ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治。

H. mollis L. ニセシラゲガヤ, モリシラゲガヤ

稀。分布：中部（茅野市）-本州（宮城・神奈川・長野・福井・三重・岡山・山口県），四国（愛媛県）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。参考：1985年に清水建美が茅野市で日本初採集。

Hordeum murinum L. ムギクサ

少。分布：北部・中部-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：明治初年。

Lolium × hybridum Hausskn. ネズミホソムギ（ネズミムギ×ホソムギ）

少。分布：全県-全国。由来：間種起源。

L. multiflorum Lam. ネズミムギ, イタリアンライグラス

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草，のり面緑化）。原産地：ヨーロッパ~北西アフリカ。渡来：明治初期。

L. perenne L. ホソムギ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草，のり面緑化）。原産地：ヨーロッパ，温帯アジア，北アフリカ，南西アジア。渡来：明治初期。

Panicum acuminatum Sw. ニコゲスカキビ

稀。分布：東部（軽井沢町・佐久市）-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

P. dichotomiflorum Michx. オオクサキビ

少。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：北アメリカ。渡来：昭和。

Paspalum notatum Flugge アメリカスズメノヒエ

稀。分布：南部（飯田市）-本州~琉球。由来：逸出（牧草，のり面緑化）。原産地：熱帯アメリカ。渡来：昭和（戦後）。

Phalaris canariensis L. カナリークサヨシ, ヤリクサヨシ

稀。分布：北部（長野市）・中部（茅野市）-全国。
由来：逸出（カナリアの餌，ドライフラワー）。原産地：カナリア諸島，北アフリカ，地中海沿岸。渡来：江戸時代末期。

Phleum pratense L. オオアワガエリ，キヌイトソウ，チモシー

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草）。原産地：ユーラシア。渡来：明治。

form. *viviparum* (Gray) Louis-Marie コモチオオアワガエリ

稀。分布：南部（木曽町）。

Poa annua L. var. *reptans* Haussk. ツルスズメノカタビラ

少。分布：北部・中部・南部-北海道，本州，四国。
由来：自然。原産地：ヨーロッパ。渡来：昭和。

P. compressa L. コイチゴツナギ

少。分布：中部・東部・南部-北海道，本州（中部以北）。由来：自然。原産地：ヨーロッパ，南西アジア。渡来：昭和。

P. palustris L. スマイチゴツナギ

少。分布：中部-北海道，本州（中部以北）。由来：自然。原産地：北半球の中～高緯度地域。渡来：大正。

P. pratensis L. subsp. *pratensis* ナガハグサ

普通。分布：全県-全国。由来：逸出（牧草，芝草）。原産地：ユーラシア。渡来：明治初期。

subsp. *angustifolia* (L.) Arcang ホソバノナガハグサ

少。分布：全県-北日本に多い。由来：自然。原産地：ユーラシア。渡来：昭和（戦後）。

subsp. *irrigata* (Lindm.) Lindb. f. ミスジナガハグサ

稀。分布：中部（松本市）・南部（根羽村）-北海道，本州。由来：自然。原産地：北西ヨーロッパ。渡来：昭和（戦後）。

P. trivialis L. subsp. *trivialis* オオスズメノカタビラ

少。分布：全県-全国。由来：自然。原産地：ヨーロッパ～西南アジア，北アフリカ。渡来：明治以降。

Sorghum halepense (L.) Pers. セイバンモロコシ

稀。分布：中部（安曇野市）-本州～九州。由来：逸出（牧草）。原産地：地中海。渡来：昭和。

form. *muticum* (Hack.) C. E. Hubb. ヒメモロコシ，ノギナシセイバンモロコシ

稀。分布：中部（塩尻市・岡谷市）。

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. var. *myuros* ナギナタグヤ

普通。分布：全県～本州～九州。由来：自然。原産

地：地中海地方～西アジア。渡来：明治初期。

TYPHACEAE ガマ科 p.292

Typha laxmannii Lepech. モウコガマ

稀。分布：東部（佐久市）-北海道，本州（千葉・神奈川・長野・兵庫県など）。由来：自然。原産地：中国東北部～ヨーロッパ。渡来：平成。

52科358種 5 間種10亜種28変種24品種 4 園芸品種 計429種類。

（学名のランクのまま数えてある）。

III 考 察

(1) 横内 斎 (1948)：信濃産歸化植物 信濃教育 No.737, p.24～35 信濃教育会

これが今回，入手できた長野県全体を対象とした最も古い歸化植物の目録と思われる。この目録には，78種類が記録されている。このうち歸化植物とは認めがたいエンジュ，ナツメ，レンギョウ，アサガオ，アメリカシオン，クワイ，パイモ，イチハツの8種と不明種のツキシマメグンバイナズナ，コハルガヤの2種を除くと68種類になる。

(2) 1948年の68種類と今回（2006年）の429種類を比較すると，6.3倍になっている。交通網の発達により，人間の移動，輸出入の増加等，歸化植物の増加する条件は増えるのみである。

(3) 科別でみると，キク科85種類，イネ科60種類，マメ科35種類，アブラナ科32種類，ナデシコ科19種類の順になる。現在の植物界の大きな科が，歸化植物でも大きな科である傾向にある。しかし，長野県ではシダ植物やカヤツリグサ科等の歸化植物が確認できないのは，なぜだろうか。

IV 主な参考文献

- 長田武正 (1972) 日本歸化植物図鑑。北隆館
長田武正 (1976) 原色日本歸化植物図鑑。保育社
清水建美 (監修) (1997) 長野県植物誌。信濃毎日新聞社
清水建美 (監修) (1998～2006)：長野県植物誌 補遺 (1～9)。長野県植物研究会誌 No.31～39
清水建美 (編) (2005) 日本の歸化植物。平凡社
清水矩宏ほか (2001) 日本歸化植物写真図鑑。全国農村教育協会
牧野富太郎 (1961) 牧野新日本植物図鑑。北隆館