

「長野県植物誌」補遺(10)

清水 建美 (編)

Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture'

Tatemi SHIMIZU(ed.)

p.220

ワタナベシダ (オシダ科) *Dryopteris carthusiana* H. P. Fuchs

標本: 南木曾町与川峠 1100m (NAC143324: 現地採集し栽培した個体からの採取による)。

分布: 南部。本州 (長野・福井県)。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(佐藤利幸)

p.220

アメリカシラネワラビ (オシダ科) *Dryopteris intermedia* A. Gray

標本: 上松町萩原 800m (AICH、上野・上野 s.n., NAC143323)。

分布: 南部。本州 (長野・岡山県)。北アメリカ原産の帰化植物。

(上野勝典、上野由貴枝)

p.367

モンツキヒナゲシ (ケシ科) *Papaver commutatum* Fisch. et Mey

標本: 明科町塔ノ原 550m (SHIN66006); 波田町鍋割 630m (SHIN67255)。

分布: 中部。欧州東部から小アジア原産の帰化植物。

(横内文人)

p.409

エゾハンノキ (カバノキ科) *Alnus japonica* (Thunb.) Stued. var. *arguta* Call.

標本: 美麻村美麻トンネル 750m (SHIN39948, 39949)。

分布: 北部。北海道、本州 (長野県)。

(中山洸)

p.428

ムラサキアオゲイトウ (ヒユ科) *Amaranthus hybridus* L. var. *erythrostachys*

標本: 四賀村反町 650m (SHIN67328, 67329)。

分布: 中部。熱帯アメリカ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.458

ホソバイヌタデ (タデ科) *Persicaria erectominor* Nakai var. *trigonocarpa* Hara

標本: 日義村神谷川 950m (SHIN66338)。

分布: 南部。本州、九州。

(中山洸)

p.458

チョウセンキンミズヒキ (タデ科) *Antenoron coreana* Nakai

標本: 佐久市関伽流山 1000m (SHIN64804)。

分布: 東部。北海道、本州 (北部、中部)。

(中山洸)

p.458

ヒメキンミズヒキ (タデ科) *Antenoron nipponica* Koidzumi

標本: 佐久市関伽流山 1000m (SHIN64803); 飯田市大和知 680m (SHIN186190)。

分布: 東部、南部。全国。

(中山洸)

p.538

セイコヤナギ (ヤナギ科) *Salix babylonica* L. f. *seiko* Kimura

標本: 小海町塩平 900m (SHIN66046)。

分布: 東部。中国原産の帰化植物。

(中山洸)

p.557

シコクハタザオ (アブラナ科) *Arabis serrata* Franch. et Sav. var. *shikokiana* Ohwi

標本: 望月町春日溪谷 1750m (SHIN66158, 66159)。

分布: 東部。本州 (千葉、東海、南畿)、四国、九州。

(中山洸)

p.573

カタオカヤマツツジ (ツツジ科) *Rhododendron kaempferi* f. *petaloidocalyx* monst. Y. Matsuda
標本：塩尻市南内田 800m (SHIN54073)。

分布：中部。

文献：塩尻市立蝶の博物館紀要：8, p.26~27 (2005)。

(松田行雄)

p.592

ケアクシバ (ツツジ科) *Vaccinium japonicum* Miq. var. *ciliaris* Nakai

標本：望月町春日溪谷 1750m (SHIN66169)。

分布：東部。本州、四国、九州。

(中山洲)

p.625

シロバナタマアジサイ (ユキノシタ科) *Hydrangea involcrata* Siebold f. *leucantha* Sugimoto

標本：南信濃村北又渡 660m (SHIN68466, 1974年8月5日、横内文人)。

分布：南部。

(横内文人)

p.640

トウノウネコノメ (ユキノシタ科) *Chrysosplenium pseudopilosum* Wakab. et Hir. Takah.

標本：天龍村満島 400m (NAC143999)。

分布：南部・本州 (岐阜, 愛知・長野県)。

(上野勝典・上野田貴枝)

p.655

ミヤマダイモンジソウ (ユキノシタ科) *Saxifraga fortunei* Hook. f. var. *mutabilis* (Koidz.) H. Nakai et H. Ohashi f. *alpina* (Matsum. et Nakai) Otsuka

標本：天狗原山 (SHIN0170394)；白馬岳 2300m (SHIN040554)；八方尾根 1900m (SHIN040531)；

燕岳 (SHIN040563)；北穂高岳 (SHIN040557)；木曾駒ヶ岳 (SHIN040552)；南駒ヶ岳 2600m (SHIN-

0145769)；甲斐駒ヶ岳 2800m (SHIN040548)；烏帽子岳 2680m (SHIN0174521)；黒斑山 2050m (SHIN114892)；米子不動 1500m (SHIN040551)；

茅野市じょうこの沢 2400m (SHIN040537)。

分布：北・中央・南アルプス、浅間連峰、八ヶ岳等の高山帯。本州。

(横内文人)

p.655

トウホクダイモンジソウ (ユキノシタ科) *Saxifraga fortunei* Hook. f. var. *mutabilis* (Koidz.) H. Nakai et H.

Ohashi f. *crassa* (Nakai) Otsuka

標本：飯山市小菅 1100m (SHIN138350)；柴村貝立山 850m (SHIN0182667)。

分布：北部。

(横内文人)

p.655

ケダイモンジソウ (ユキノシタ科) *Saxifraga fortunei* Hook. f. var. *mutabilis* (Koidz.) H. Nakai et H. Ohashi f. *pilosa* Hara

標本：生坂村山清路 470m (SHIN136830)；波田町竜島 700m (SHIN040452)。

分布：中部。

(横内文人)

p.655

ムラサキダイモンジソウ (ユキノシタ科) *Saxifraga fortunei* Hook. f. var. *mutabilis* (Koidz.) H. Nakai et H. Ohashi f. *purpurea* Nakai

標本：長谷村戸台 1000m (SHIN120935)；富士見町釜無白川 1100m (SHIN126078)。

分布：南部。

(横内文人)

p.666

ノモモ (バラ科) *Prunus persica* Stokes f. *subspontanea* (Makino) Sugimoto

標本：豊野町つつじ山 600m (SHIN112960)；長野市奇妙山 420m (SHIN39645)；戸倉町宮坂峠 500m (SHIN159018)；北相木村坂上 1100m (SHIN122660)；富士見町下薦木 720m (SHIN76383)；四賀村会田 600m (SHIN76052)；

長谷村戸台 1000m (SHIN39625)。

分布：全県。本州、九州。中国原産の帰化植物。

(横内文人)

p.666

ヤエモモ (バラ科) *Prunus persica* Stokes f. *dianthiflora* Hort

標本：四賀村執田光 650m (SHIN155928)。

分布：中部。中国原産の帰化植物。

(横内文人)

p.690

クビキダイコンソウ (バラ科) *Geum japonicum* Thunb. ex Murray f. *yokouchii* Mizushima

標本：木島平村カヤノ平 1500m (SHIN64330)；王滝村清滝 1200m (SHIN64745)。

分布：北部、南部。

- (中山溯)
- p.694
タチゲヒメヘビイチゴ (バラ科) *Potentilla centigrana* Maxim. f. *patens* Hiyama
標本：堀金村あづみの公園 650m (SHIN66031)。
分布：中部。
- (中山溯)
- p.702
コモノウラジロノキ (バラ科) *Sorbus japonica* Hedel. f. *denudata* Hiyama
標本：信濃町赤川 700m (SHIN67065)。
分布：北部。
- (中山溯)
- p.707
タマザキクサフジ (マメ科) *Securigera varia* (L.) Lassen
標本：大町市農具川 750m (SHIN66834, 66835)。
分布：北部。北海道、本州。ヨーロッパ中南部、西アジア原産の帰化植物。
- (中山溯)
- p.714
ベニバナツメクサ (マメ科) *Trifolium incarnatum* L.
標本：波田町下島 620m (SHIN67256)。
分布：中部。全国。ヨーロッパ、北アフリカ、西アジア原産の帰化植物。
- (横内文人)
- p.730
シロバナフジ (マメ科) *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. f. *alba* Rehd. et Wils.
標本：波田町下島 640m (SHIN67209, 67210)。
分布：中部。
- (横内文人)
- p.735
シロバナカラスノエンドウ (マメ科) *Vicia angustifolia* L. f. *leucantha* Sugimoto
標本：麻績村小東 750m (SHIN67214, 67215)。
分布：中部。
- (横内文人)
- p.847
ヒメウコギ (ウコギ科) *Acanthopanax sieboldianus* Makino
標本：梓川村梓川 600m (SHIN67239)。
分布：中部。東北、長野県。中国原産の帰化植物。
- (横内文人)
- p.931
ケブカツルカコソウ (シソ科) *Ajuga shikotanensis* Miyabe et Tatew. f. *hirsuta* (Honda) Murata
標本：立科町女神湖 1500m (SHIN64910)。
分布：東部。
- (中山溯)
- p.951
フイリカキドオシ (シソ科) *Glechoma hederacea* L. subsp. *grandis* (A. Gray) Hara f. *albovariegata* Hara
標本：松本市県 600m (SHIN67222, 1976年8月9日、横内文人)。
分布：中部。
- (横内文人)
- p.972
ツタバウンラン (ゴマノハグサ科) *Cymbalaria muralis* Caertn. Mey. et Scherb.
標本：須坂市村山町 330m (SHIN67313)；松本市女島羽 600m (SHIN67236)；松本市庄内 590m (SHIN67344)；松本市信州大学構内 (SHIN67604)。
分布：北部、中部。全国。地中海沿岸原産の帰化植物。
- (中山溯・横内文人)
- p.1016
ミドリツルニンジン (キキョウ科) *Codonopsis lanceolata* (Siebold et Zucc.) Trautv. form. *immaculata* Hara
標本：波田町黒川 1000m (SHIN68460)。
分布：中部。
- (横内文人)
- p.1036
ケニワトコ (スイカズラ科) *Sambucus racemosa* L. var. *pubescens* Nakai
標本：白馬村飯田 750m (SHIN65009)。
分布：北部。本州、四国。
- (中山溯)
- p.1039
キミノコバナガマズミ (スイカズラ科) *Viburnum erosum* Thunb. ex Murray f. *xanthocarpum* Hara
標本：日義村神谷川 950m (SHIN66349)。
分布：南部。
- (中山溯)
- p.1235
ヒゲアブラガヤ、エゾアブラガヤ (カヤツリグサ科) *Scirpus wichural* Bocklr. var. *asiaticus* T. Koyama
標本：大岡村小花見池 830m (SHIN66991)。

分布：中部。北海道～九州。

(中山洸)

p.1287

ヤマキタザサ (イネ科) *Nipponobambusa yamakitensis* Muroi

標本：生坂村上ノ平 800m (SHIN181859)。

分布：中部。本州 (神奈川県、長野県)。

(中山洸)

p.1287

クロチク、ゴマダケ、ニタグロチク (イネ科) *Phyllostachys nigra* (Loddiges) Munro var. *nigro*

標本：阿南町寺山 800m (SHIN201761, 寺島虎男、1951年11月16日)。

分布：南部。中国原産。北海道南部以南。

(中山洸)

p.1288

ナスノユカワザサ (イネ科) *Sasa kogasensis* Nakai var. *nasuensis* (Kimura et S. Suzuki) S. Suzuki

標本：東部町池の平 2050m (SHIN67013)。

分布：東部。本州 (北部・中部の太平洋側)。

(中山洸)

p.1288

サイヨウザサ (イネ科) *Sasa stenophylla* Koidzumi subsp. *stenophylla*

標本：松本市浅間 600m (SHIN201652, 清水建美、1976年4月29日)；飯田市竜峡公園 (SHIN201646, 望月精一、1939年11月12日)；塩尻市今村神社 670m (SHIN201613, 清水建美、1976年5月6日)。

分布：中部、南部。本州 (西南部)、九州。

(中山洸)

p.1295

ダイサンチク (イネ科) *Bambusa vulgaris* Schrader ex Wendland

標本：飯田市時又 420m (SHIN201647, 望月精一、1939年12月14日)。

分布：南部。東海地方以西。

(中山洸)

p.1297

ヒメカミザサ (イネ科) *Neosamamorphia tobagenzoana* Makino et Uchida

標本：明科町大足 620m (SHIN63845)；明科町吐中 600m (SHIN63067)。

分布：中部。本州 (岩手、長野県)。

(中山洸)

p.1300

リュウキュウチク、ギョウヨウチク (イネ科)

Pleiblastus linearis (Hackel) Nakai

標本：飯田市千代 (SHIN201648, 寺島虎男、1939年10月11日)。

分布：南部。琉球諸島原産。関東以西で栽培。

(中山洸)

p.1302

スタレヨシ、ゴキダケ (イネ科) *Pleiblastus Chino* (Franchet et Savatier) Makino var. *viridis* (Makino) S. Suzuki f. *pumilis* (Mitford) S. Suzuki

標本：飯田市鼎 510m (SHIN201649, 望月精一、1939年10月30日)。

分布：南部。

(中山洸)

p.1378

エダウチチチミザチ (イネ科) *Oplismenus compositus* Beauv.

標本：飯田市土曽川 500m (SHIN186738)。

分布：南部。東南アジア、オーストラリア、アフリカ原産の帰化植物。

(中山洸)

p.1456

ホソバタチシオデ (シオデ科) *Smilax riparia* A. DC. f. *stenophylla* T. Koyama

標本：飯田市竜江 550m (SHIN67761)。

分布：南部。

(中山洸)

p.1490

ヒメシカクイ (カヤツリグサ科) *Eleocharis × yezoensis* Hara

標本：望月町印内 750m (SHIN66852, 66853)。

分布：東部。北海道 (旧高)、本州 (栃木・山梨・長野県)。

(中山洸)