

「長野県植物誌」 補遺 (11)

清水建美 (編)

Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' XI

Tatemi SHIMIZU (ed.)

p.371

キレハマエンゴサク (ケマンソウ科) *Corydalis lineariloba* Siebold et Zucc.f.sp.

標本: 立科町津金寺 700 m (SHIN68333)。

分布: 東部。

(中山洌)

p.469

ハチジョウイタドリ、ミハライタドリ (タデ科)

Reynoutria japonica Houtt.var *terminalis* Honda

標本: 軽井沢町石尊山 1400 m (SHIN67797)。

分布: 東部。本州 (長野県、伊豆七島)。

(中山洌)

p.501

ニオイスマレ (スミレ科) *Viola odorata* L.

標本: 四賀村会田 610 m (SHIN69010)。

分布: 中部。地中海沿岸原産の帰化植物。

(横内文人)

p.503

オオハイスミレ (スミレ科) *Viola hondoensis* W.Becker et H.Boissieu f.sp.

標本: 野沢温泉村野沢温泉 400 m (SHIN68343) ;

白馬村親海湿原 750 m (SHIN68342)。

分布: 北部。本州 (長野県北部)。

(中山洌)

p.614

ノジオカトラノオ (サクラソウ科) *Lysimachia fortunei*× *barystachys*

標本: 松本市下立田 650 m (NAC146625)。

分布: 中部。本州 (長野県、千葉県)。

ノジトラノオとオカトラノオの間種。

(上野勝典・上野由貴枝)

p.671

キクザキヤマブキ (バラ科) *Kerria japonica* (L.)DC.f. *stellata* (Makino) Ohwi

標本: 富士見町富士見 900 m (SHIN68501)。

分布: 南部。

(横内文人)

p.778

マサキ (ニシキギ科) *Euonymus japonicus* Thunb.

標本: 須坂市臥竜山 400 m (SHIN0180925) ; 松本

市井川城 590 m (SHIN69005) ; 梓川村真光寺 800

m (SHIN69004, 清水建美, 1973.8.2) ; 高森町竜の

口 460 m (SHIN0143414)。

分布: 中部、南部。北海道~九州。

(横内文人)

p.833

エゾミヤマカタバミ (カタバミ科) *Oxilis acetosella*L.f. *vegeta* Mizushima

標本: 木島平村カヤの平 1550 m (SHIN64692)。

分布: 北部。

(中山洌)

p.901

トマトダマシ (ナス科) *Solanum rostratum* Dunal

標本: 小諸市一本柳 700 m (SHIN68419, 68420)。

分布: 東部。本州 (関東以西)。北アメリカ西部、

メキシコ原産の帰化植物。

(中沢富士子・中山洌)

p.940

サクノキバナアキギリ (シソ科) *Salvia* × *sakuensis*

Narh. et Hihara

標本: 佐久市常和 910 m (SHIN67981, 67982)。

分布: 東部。

(中山洌)

p.961

ダンゴザキヘラオオバコ (オオバコ科) *Plantago**lanceolata* L.f.sp.

標本: 松本市井川城 590 m (SHIN69011, 69012)。

分布: 中部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.982

ホナガカワデシャ (ゴマノハグサ科) *Veronica* ×*myriantha* Tos.Tanaka

標本: 豊科町光橋 560 m (SHIN68421, 68777, 687

78, 68779, 67780)。

分布:中部。本州(長野県、京都府、大阪府、兵庫県)。
カワデシャとオオカワデシャの間種。

(中山洌)

p.1127

セイヨウトゲアザミ(キク科) *Cirsium arvense* (L.)
Scop.

標本:小谷村池の田(KPM-NAO106287)。

分布:北部。ヨーロッパ原産の帰化植物。

文献:高橋秀男・池上睦美(1998):長野県小谷村の
植物 p.101。

(横内文人)

p.1224

マシカクイ(カヤツリグサ科) *Eleocharis acicularis*
Roem.et Schult.

標本:信州新町大花見池 900 m (SHIN68813)。

分布:北部。本州(長野県、近江、中国)、四国、
九州。

(中山洌)

p.1382

フィリアキメヒシバ(イネ科) *Digitaria ischaemum*
(Schreb.) Schreb.ex Muhl.var. *asiatica* Ohwi f. *striate*
Sugimoto

標本:波田町三溝 640m(SHIN68510,68511,
1974.9.13、横内文人)。

分布:中部。

(横内文人)

p.1029

ハナムグラ(アカネ科) *Galium dahuricum* Turcz, var.
tokyoense Cufod.

標本:軽井沢町御影用水 980m(SHIN67928)。

分布:東部。本州(東北・中部)。

(中山洌)

p.1248

ライムギ、クロムギ、ナツコムギ(イネ科) *Ceale*
cereale L.

標本:南相木村栗生川 1050 m (SHIN62454)。

分布:東部。小アジア、コーカサス、アフガニスタ
ン原産の帰化植物。

(中山洌)

p.1300

オキナダケ(イネ科) *Pleioblastus argenteostriatus* (Regel)
Nakai

標本:丸子町松山 K.K 650 m (SHIN68543,68544)。

分布:中部。

(中山洌)

p.1338

ケノガリヤス(イネ科) *Calamagrostis arundinacea*
Roth. var. *brachytricha* Hack. f. *hirsuta* Ohwi

標本:軽井沢町御影用水 1000m(SHIN67536)。

分布:東部。

(中山洌)