

「長野県植物誌」補遺 (13)

清水 建美 (編)

Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (13)

Tatemi Shimizu (ed.)

p.405

フモトミズナラ、モンゴリナラ (ブナ科)

Quercus crispula Blume var. *mongolicoides* (H.Ohba) Seriz.

標本: 飯田市竹佐・箱川 590 m (ICMHE0001512)。

分布: 南部。本州 (東海東部、北関東)。

文献: 蛭間 啓 (2009) 飯田市でフモトミズナラ (モンゴリナラ) の生育を確認 伊那谷自然史論集 Vol.10, p.81 ~ 82 飯田市美術館

(横内文人)

p.501

サンシキスミレ、パンジー (スミレ科)

Viola wittrockiana Gams.

標本: 富士見町富里 900 m (SHIN105368)。

分布: 南部。ヨーロッパ産の雑種。帰化植物。

(横内文人)

p.610

カラタチバナ (ヤブコウジ科)

Ardisia crispa (Thunb.) A.DC.

標本: 天龍村福島 330 m (NAC129168)。

分布: 南部。本州 (茨城県・新潟県以西)、四国、九州。

文献: 蛭間 啓・大塚孝一 (2009) 長野県飯田市三ツ山でカラタチバナの生育を確認 伊那谷自然史論集 Vol.10, p.80 飯田市美術館

(横内文人)

p.653

セイカクロクモソウ (ユキノシタ科)

Saxifraga fusca Maxim. var. *kikubuki* Ohwi f. *viridiflora* Sugimoto

標本: 堀金村三股〜蝶ヶ岳 2000 m (MAD 番号なし)。

分布: 中部。

(横内文人)

p.653 チシマイワブキ 削除する。

タテヤマイワブキ (ユキノシタ科)

Saxifraga nelsoniana var. *tateyamensis* H.Ohba

標本: 大町市鹿島槍ヶ岳 2800 m (SHIN121894), 大町市槍ヶ岳 3000 m (SHIN178113)、安曇村槍ヶ岳南 2800 m (SHIN121894)。

分布: 北アルプス。本州 (立山、白馬岳、鹿島槍ヶ岳、槍ヶ岳、穂高岳)。

文献: ①清水建美 (2002): 高山に咲く花 p.273 (山溪ハンディ図鑑) ②長野県 (2002): 長野県版レッドデータブック (維管束植物編) p.148

参考: 長野県植物誌 p.653 では、チシマイワブキとして扱われたが、本州中部のものは新変種タテヤマイワブキとなった。チシマイワブキは、北海道 (利尻島、大雪山系)、千島、サハリンに分布する。

(横内文人)

p.830

カラフトシキミ、ウチコミツルミヤマシキミ

(ミカン科) *Skimmia japonica* var. *intermedia* Komatsu

標本: 朝日村中俣沢 1200 m (SHIN106691, 清沢晴親, 1977 年 9 月)。

分布: 中部。北海道、本州 (北部、中部)。

(横内文人)

p.844

メダラ (ウコギ科)

Aralia elata Seem. var. *canescens* Nakai

標本: 小谷村大綱 300 m (SHIN078866, 078886, 078896)。

分布: 北部。

(横内文人)

p.932

シロバナニシキゴロモ (シソ科)

Ajuga yesoensis Maxim. f. *albiflora* Honda

標本: 小谷村親ノ原 800 m (SHIN145577)。

分布: 北部。

(横内文人)

p.988

シロバナヨツバシオガマ (ゴマノハグサ科)

Pedicularis chamissonis Steven var. *japonica* (Miq.)Maxim. f. *leucantha* Horii

標本: 小谷村楯池自然園 1800 m (SHIN121707)。

分布: 中部。

(横内文人)

p.1166

ツルカワラニガナ (キク科) *Ixeris* × *nikoensis* Nakai

標本: 長谷村戸台 (KPM107548, 107552, 107553)。

分布: 南部。本州 (日光)。イワニガナとカワラニガナの間種。

(横内文人)