

「長野県植物誌」補遺 (16)

清水建美 (編)

Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (16)

Tatemi Shimizu (ed.)

p.292

シデコブシ (ヒメコブシ) (クスノキ科)

Magnolia stellata Maxim.

標本：梓川村梓川、古い河岸段丘 (SHIN69773, 69774)。

分布：中部。本州 (中部地方南西部)。

備考：本来の分布域ではない。周辺の民家の植栽木の種子が、動物によって運搬されたものとする。国内帰化植物。

(横内文人・飯沼冬彦)

備考：古くは、パピリオ *V. papilionacea* Pursh とされていた。

(横内文人)

p.729

キダチコマツナギ (マメ科)

Indigofera bungeana Walpers ?

標本：麻績村女淵 650 m (SHIN69787)。

分布：中部。道路のり面。中国原産の帰化植物。

備考：本種の学名は未決定としている。日本在来のコマツナギ *I. pseudotinctoria* Matsum. とは、明らかに植物体のサイズは異なる。

(横内文人)

p.305

オオバウマノスズクサ (ウマノスズクサ科)

Aristolochia kaempferi Willd.

標本：なし。

文献：長野県レッドリスト (植物編) 2014 p.94。

備考：本種は長野県植物誌 (1997)p.305 に種名は記載されているが、標本の記載がなかったため、今回、信州大学自然科学館 (SHIN) の再調査をした。該当する標本が見当たらなかったため削除する。

(横内文人)

p.757

ユウゲシヨウ (アカバナ科)

Oenothera rosea L'H-r.

標本：池田町林中 580 m (SHIN69805)。

分布：中部。荒地。本州、四国。北アメリカ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.443

ツルナ (ツルナ科)

Demidovia tetragonoides O.Kunze

標本：富士見町富里 970 m (SHIN156200)。

分布：南部。畑の中。北海道～沖縄の海岸地方。

備考：もともとは若芽を食用として栽培したものである。野化状態であり、国内帰化植物にあたる。

(横内文人)

p.759

ススヤアカバナ (アカバナ科)

Epilobium parviflorum Schreber

標本：穂高町矢原 530 m (SHIN69838)。

分布：中部。湿け地。本州 (千葉・茨城・石川・富山・長野県)。一中国中部および東北部サハリン南部 (ススヤ川)。

(横内文人・松田貴子)

p.501

アメリカスミレサイシン (スミレ科)

Viola sororia Willd.

標本：松本市県 信州大学構内 590 m (SHIN69731, 1976年6月26日、横内文人)；飯田市 (SHIN69732, 1976年6月6日、採者不詳)。

分布：中部、南部。路傍。北アメリカ原産の帰化植物。

p.851

コエンドロ、コリアンダー (セリ科)

Coriandrum sativum L.

標本：四賀村会田小穴沢口 630 m (SHIN69704)。

分布：中部。荒地。本州 (関東以西)。地中海沿岸原産の帰化植物。

(横内文人)

p.851

ノラニンジン (セリ科)

Daucus carota L.

標本：塩尻市小坂田公園 830 m (SHIN69749, 69750)、明科町明科駅裏 530 m (SHIN69769, 69770)。

分布：中部。路傍。本州。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.891

ツルニチニチソウ (キョウチクトウ科)

Vinca major L.

標本：生坂村日野 500 m (SHIN69808)。

フクリンツルニチニチソウ

form. *elegantissima* H. ort.

標本：坂井村杉崎 700 m (SHIN69813)。

分布：中部。道路のり面。南ヨーロッパ、北アフリカ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.914

アレチウシノシタゲサ (ムラサキ科)

Anchusa arvensis (Linn.) M. Bleb.

標本：穂高町柏原 580 m (SHIN69832)。

分布：中部。新しい水田造成地の土手等。本州（神奈川県へ 1999 年に渡来、長野県）。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(横内文人・松田貴子)

p.995

ムラサキウンラン、ヒメキンギョソウ (ゴマノハグサ科)

Linaria bipartita Willd.

標本：穂高町牧の堤 700 m (SHIN69730)、四賀村新町 600 m (SHIN69882)、朝日村中大池 700 m (SHIN69872)。

分布：中部。路傍。北アフリカ、ポルトガル、スペイン南部原産の帰化植物。

(横内文人・藤田淳一・飯沼冬彦)

p.1029

シラホシムグラ (アカネ科)

Galium aparine L.

標本：松本市旭 女鳥羽川 620 m (SHIN69780 ~ 69786)。

分布：中部。河川敷。本州（東京都、神奈川・静岡・長野・兵庫県、大阪府）、四国（香川県）。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(堀井日香里)

p.1054

カラクサシュンギク、ダールベルデージ (キク科)

Thymophylla tenuiloba (DC.) Small

標本：松本市南松本 (SHIN69818)。

分布：中部。乾燥した荒地。北アメリカ南部からメキシコ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.1172

キバナコウリンタンポポ、ノハラタンポポ (キク科)

Hieracium caespitosum Dumor

標本：松本市岡田矢作 700 m (SHIN69775, 69776)。

分布：中部。水田の土手。北海道、本州（岩手・長野県）。ヨーロッパ（南部を除く）原産の帰化植物。

(横内文人)

p.1287

ホテイチク (イネ科タケ亜科)

Phyllostachys aurea Carriere ex A. Riviere et C. Riviere

標本：四賀村新町 630 m (SHIN69777, 69778)。

分布：中部。ケヤキ林内。全国。中国原産。逸出。

(横内文人)