

「長野県植物誌」補遺 (17)

清水建美 (編)

Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (17)

Tatemi Shimizu (ed.)

p.302

ヤエドクダミ (ドクダミ科)

Houttuynia cordata Thunb. f. *plena* Okuyama

標本: 松本市波田鍋割 700 m (SHIN69835)

2018.6.18。

分布: 中部。路傍。

(横内文人)

p.316

チドリソウ、ラークスパー、ヒエンソウ (キンボウ
ゲ科)*Delphinium ajacis* Linn.Schur

標本: 松本市会田新町 600 m (SHIN69826)

2018.6.16。

分布: 中部。のり面。南オーストラリア原産の逸出
植物。

(横内文人)

p.493

フウロアオイ (アオイ科)

Callirhoe involucrata Torr.

標本: 松本市新村 620 m (SHIN69853) 2017.9.1。

分布: 中部。荒地。北アメリカ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.836

ピレネーフウロ (フウロソウ科)

Geranium pyrenaicum Burm.f.

標本: 安曇野市明科下押野 500 m

(SHIN69664,69665) 2019.7.6。

分布: 中部。路傍。ヨーロッパ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.925

シロシキブ (クマツヅラ科)

Callicarpa japonica Thunb.f. *albibacca* H.Hara

標本: 池田町林中 580 m (SHIN69877)

2018.9.23。

分布: 中部。路傍。

(横内文人)

p.963

レンギョウ (モクセイ科)

Forsythia suspensa Vahl.

標本: 松本市四賀本町 640 m (SHIN69833)

2018.4.30。

分布: 中部。石垣。中国原産の逸出植物。

(横内文人)

p.1054

マツバハルシャギク (キク科)

Helenium tenuifolium Nutt.

標本: 塩尻市広丘北洞橋 670 m (SHIN69618)

2017.7.7。

分布: 中部。荒地。本州、九州。北アメリカ (バー
ジニア州~テキサス州) 原産の逸出植物。

(横内文人)

p.1093

ペラペラヨメナ、ペラペラヒメジョオン、メキシコ
ヒナギク*Erigeron karvinskianus* DC.

標本: 安曇野市豊科大11沢 550 m (SHIN69662)

2019.11.1。

分布: 中部。石垣。中央アメリカ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.1172

ハイコウリントンポポ (キク科)

Pilosella officinarum F. Schultz ex Schultz-Bip.

標本: 松本市岡田矢作 700 m (SHIN69775,69776)

2014.5.25。

分布: 中部。水田の土手。北海道、本州 (石川・長
野県)。ヨーロッパ原産の帰化植物。

文献: 長野県外来植物目録 p.68。

備考: 補遺 (16) のキバナコウリントンポポは、誤

同定につき訂正する。

（横内文人）

Leucojum aestivum L.

標本：安曇野市明科御宝田 520 m (SHIN69834)
2018.4.13。

p.1404

スズランズイセン、スノーフレイク、オオナツユキ
ソウ（ユリ科）

分布：中部。犀川河川敷。ヨーロッパ南部、イギリス、
西アジア（クリミア、コーカサス）原産の逸出植物。

（横内文人）