

## 「長野県植物誌」補遺 (18)

清水建美 (編)

Supplement to 'Flora of Nagano Prefecture' (18)

Tatemi Shimizu (ed.)

p.193

ホウライシダ (ホウライシダ科)

*Adiantum capillus-veneris* L.標本：松本市中央（旧・小池町通り）590 m  
(SHIN69658)。2020.11.2。分布：中部。本州（関東以西）、四国、九州。湧水  
の流れる水路の石垣。

備考：国内帰化植物。

(横内文人)

p.458

ヒメツルソバ (タデ科)

*Persicaria capitata* (Buch.-Ham.ex D.Don) H.Gross標本：松本市中央（旧・高砂通り）600 m  
(SHIN0205314)。2021.11.25。

分布：中部。石垣。

備考：中国～ヒマラヤ原産の帰化植物。

(横内文人)

p.272

シダレアカマツ (マツ科)

*Pinus densiflora* Sieb. et Zucc.form.*pendula* (Mayr.)標本：松川村川西 安曇野ちひろ美術館近く 600 m  
(SHIN0205319)。2020.10.14。

分布：中部。

(横内文人)

p.661

アカバナユキヤナギ (バラ科)

*Spiraea thunbergii* Sieb. f.sp.標本：松本市四賀本町 600 m (SHIN0205317)。  
2021.4.4。

分布：中部。路傍。

備考：ユキヤナギの赤色花。中国原産の逸出植物。

(横内文人)

p.408

シダレグリ (ブナ科)

*Castanea crenata* Seib. et Zucc. f. *pendula* Makino標本：塩尻市小野吉 900 m (SHIN0205306)。  
2021.6.2。

分布：中部。

備考：辰野町には国指定の天然記念物の自生地がある。面積約 3 ha, その数約 3,000 本と言う。フォッサマグナ要素の代表と言われる。

(横内文人)

p.661

ニワザクラ (バラ科)

*Prunus glandulosa* Thunb. ex Murray標本：松本市四賀新町 600 m (SHIN0205312)。  
2022.4.14。

分布：中部。会田川の土手。

備考：中国中部原産の逸出植物。

(横内文人)

p.427 (アカザ科の次へ)

オシロイバナ (オシロイバナ科)

*Mirabilis jalapa* L.標本：松本市四賀本町 600 m (SHIN0205324)。  
2022.9.7。

分布：中部。のり面。

備考：西インド原産の逸出植物。

(横内文人)

p.910

キバナマルバルコウ (ヒルガオ科)

*Quamoclit coccinea* (Lottl.) Moench f.sp.標本：安曇野市豊科大村 600 m (SHIN0205318)。  
2020.10.20。

分布：中部。荒れ地。

備考：マルバルコウの黄花品。熱帯アメリカ原産の  
帰化植物。

(横内文人)

p.957

キバナオドリコソウ（シソ科）

*Lamium galeobdolon* (L.) L. subsp. *argentatum*  
(Smejkal) J.Duvign.

標本：上田市八木沢 600 m (SHIN0205313)。

2021.4.30。

分布：中部。のり面。

備考：ヨーロッパ東部～西アジア原産の逸出植物。  
葉に銀灰色の斑入り亜種。

(横内文人)

2020.6.17 枝と葉。筑北村坂北六工 600 m

(SHIN0205316)。2022.4.1 花。

分布：中部。のり面。

備考：中国原産の逸出植物。

(横内文人)

p.963

シナレンギョウ（モクセイ科）

*Fersytha viridissima* Lindl.

標本：筑北村坂北七ツ松 600 m (SHIN69678)。

p.963

ヒイラギ（モクセイ科）

*Osmanthus ilicifolius* Mouill.標本：松本市中央 松本市美術館近く 590 m  
(SHIN0205327)。2022.7.8。分布：中部。放棄庭園。本州（福島以南）、四国、  
九州（祖母山）。一台湾。

備考：庭木からの逸出。国内帰化植物。

(横内文人)